

1/5 到中点之间呈三角形突出，上有小刺突；阳茎略比抱器瓣短，中部侧面有 1 枚细长的突起，末端边缘细锯齿形，阳茎端膜内有许多小刺突。

观察标本：广西龙胜 1 ♂，1980.VI.10.

分布：广西（龙胜）；越南，马来西亚，印度尼西亚。

23. 隼舟蛾属 *Tensha* Matsumura, 1925

Tensha Matsumura, 1925, *Zool. Mag. Tokyo*, 37: 392.

Type species: *Tensha striatella* Matsumura, 1925.

喙退化，很短。下唇须棒状，上举；第 3 节小而前伸。触角双栉齿状，端部 1/3 锯齿状。前翅窄，没有副室，R₅ 与 M₁ 脉有很长的共柄，R₅ 脉远在 R₂ 脉之后分出；中室横脉与肘脉几乎成直角；M₂ 脉出自中室端脉的中部；Cu₁ 脉远离中室下角；外缘稍曲。后翅 R_s 与 M₁ 脉共柄，该柄很长；外缘较圆。有臀簇。

本属包括 3 种，分布在东洋区。我国已知 2 种。

分种检索表

1. 体大；♂外生殖器的爪形突窄，基部有 1 枚长指状突起 条纹隼舟蛾 *T. striatella*
 体小；♂外生殖器的爪形突宽，端部扩大有突起 德隼舟蛾 *T. delineivena*

(52) 条纹隼舟蛾 *Tensha striatella* Matsumura, 1925 (图 65)

Tensha striatella Matsumura, 1925, *Zool. Mag. Tokyo*, 37: 392.

头部黄褐色。前胸黄褐色。肩板黄白色，混有少量浅褐色毛。腹部背面黄褐色，末节及臀簇黄白色；腹面黄白色。下唇须内侧黄白色，外侧黄褐色，上缘深褐色。触角黄褐色，基部有短毛簇。前翅黄褐色，散布许多暗褐色鳞片，翅脉暗褐色；前缘有数条暗褐色短斜纹；中室端脉纹为 1 条浅黄白色细线；翅中部在中室下方有 1 块浅黄白色的圆形大斑。后翅黄褐色，前缘色浅，缘毛基部有明显的浅色基线。外形与 *T. delineivena* (Swinhoe) 相似，但体型较大，前翅较窄。

雄性外生殖器：爪形突长，末端扩大并分岔；颞形突短；抱器瓣长，略呈三角形，末端较圆，左右抱器瓣间有横带相连；阳茎比抱器瓣稍长，阳茎端膜内端部有一些刺突；囊形突不明显。

观察标本：作者未见标本。

分布：台湾。

(53) 德隼舟蛾 *Tensha delineivena* (Swinhoe, 1894) (图 66, 图版 II: 23)

Turnaca delineivena Swinhoe, 1894, *Trans. Ent. Soc. London*, : 159.