

1♂, 1989.VII.29, 利川星斗山 800 m, 1♂, 1989.VII.23; 贵州雷公山, 1♂, 1988.VIII.13。

分布: 福建(武夷山、挂墩)、江西(大余、石城)、湖北(兴山、鹤峰、利川)、湖南(大庸、桑植)、广西(苗儿山、金秀、那坡)、四川(峨眉山、灌县、康定)、贵州(雷公山)。

(409) 拟土舟蛾 *Togepteryx incongruens* Schintlmeister, 1989 (图 422)

Togepteryx incongruens Schintlmeister, 1989, Neue Ent. Nachr. 25: 113.

翅展♂40 mm。下唇须和额暗红褐色。头部、翅基片和胸部背面前半部灰白色, 胸部背面后半部暗红褐色。腹部背面暗灰褐色。前翅灰稍带红褐色, 从前缘近基部到外缘有1条黑褐色纵带, 纵带前方较灰白色, 纵带后方颜色逐渐变浅到后缘呈白色; 内、外线不清晰, 黑褐色锯齿形, 只有后半段隐约可见; 脉端缘毛灰稍带红褐色, 其余灰白色。后翅暗灰褐色, 缘毛同前翅。

雄性外生殖器: 爪形突基部宽, 端部窄而弯, 亚端背面有1个岔状突起, 使整个爪形突似山羊头; 颚形突短小; 抱器瓣狭长, 末端较尖, 抱器腹基部和端部2/3处各有1枚齿状突; 阳茎端基环略呈三角形, 但其顶角为双齿状; 阳茎细, 端部侧面有1枚大角突。



图 422 拟土舟蛾 *Togepteryx incongruens* Schintlmeister 的
雄性外生殖器 (据 Schintlmeister, 1992)

观察标本: 本种目前仅有正模标本, 1931年8月1日采自浙江天目山, 存德国波恩, 我们未见标本。

分布: 浙江(天目山)。

本种外形与背白土舟蛾 *T. dorsoalbida* Schintlmeister 很相似, 但本种前翅外线在前缘的暗点不明显, 可与之相区别。

112. 丽齿舟蛾属 *Himeropteryx* Staudinger, 1887

Himeropteryx Staudinger, 1887, Mem. Roman. 3: 228.