

毛较密，刚毛状，半平伏或半直立；领约与头顶后缘嵴等粗；胝区微隆。半鞘翅后方强烈下折。胫节刺黑色，较为粗壮明显。

左阳基侧突或与 *Apolygus* 属相似，端突区域呈鹅头状而末端呈小扁片状；或端突区域基方较为扁平，并加粗扩展，有时大体分为粗短的二叉状，下支较长而端缘平截，一侧端角略呈弯钩状；此外，端突区的亚基部常伸出成一角状突起。

阳茎端具两枚细长的针突状骨化附器，常被一槽状骨片后所包围，为此属的特点；其余与 *Apolygus* 属相似。雌性交配囊后壁构造甚似 *Apolygus* 属，支间叶末端不圆钝膨大。

已知 7 种，均为亚洲东部分布。我国已知 6 种。

此属与 *Apolygus* 属近似，若干种类曾置于 *Apolygus* 属中；最近根据阳茎端特点视之为独立属。

### 种 检 索 表

1. 喙较长，至少伸达后足基节中央 ..... 2  
    喙较短，仅伸达或略伸过中足基节 ..... 4
2. 体小，体长 3.5~3.6mm。头顶狭于眼。触角第 II 节基部一窄环与端部 1/4 黑色 .....  
    ..... 峨眉异丽盲蝽 *A. emeia*  
    体较大，体长在 3.6mm 以上。头顶宽于眼。触角第 II 节色不同上述 ..... 3
3. 阳茎端翼骨片由 2 瓣大骨片组成 ..... 东亚异丽盲蝽 *A. nigritulus*  
    阳茎端翼骨片由 3 瓣大骨片组成 ..... 斑驳异丽盲蝽 *A. mosaicus*
4. 小盾片基角有一黑褐色三角形斑。革片端部有“V”字形黑褐色斑 ..... 5  
    小盾片基角无深色斑。中部两侧各有一扇形大黑斑。革片端部无“V”字形深色斑 .....  
    ..... 扇斑异丽盲蝽 *A. picturatus*
5. 小盾片基角斑褐色。胫节刺基部无小黑点斑。喙伸达中足基节末端 .....  
    ..... 云南异丽盲蝽 *A. yunnananus*  
    小盾片基角斑黑色。胫节刺基部有小黑点斑。喙仅伸达中足基节基部 ... 秀异丽盲蝽 *A. elegans*

#### (50) 秀异丽盲蝽 *Apolygopsis elegans* (Zheng et Wang, 1983) (图 24, 图版 II-8)

*Lygus* (*Apolygus*) *elegans* Zheng et Wang, 1983a: 52, 58.

*Lygocoris elegans* (Zheng et Wang): Schuh, 1995: 796.

*Lygocoris* (*Apolygus*) *elegans* (Zheng et Wang): Zheng, 1995: 463; Lu & Zheng, 1996: 136.

*Apolygus elegans* (Zheng et Wang): Kerzhner & Josifov, 1999: 63.

*Apolygopsis elegans* (Zheng et Wang): Yasunaga, Schwartz & Chérot, 2002: 1.

体椭圆形，有光泽。

头垂直，淡褐或淡红褐色；唇基端部背面 1/3 及其侧方的大部黑色；上颚片黑；下