

爪片不透明，基内半及整个内缘黑褐，其余污黄褐。革片及楔片淡黄褐，革片色较深。半鞘翅无刻点及毛。膜片一色淡烟黄，脉黑褐，整齐。

前胸侧板黑褐，背板前侧角黄白色区域的一部分延入侧板。中胸侧板后缘及腹缘宽黑带状。后胸侧板后半大半黑色。臭腺沟缘及蒸发域淡黄白。足淡黄褐；胫节末端黑褐；后足股节端部及后足胫节基半黑褐。雄虫腹下淡黄白，基半侧缘黑宽带状，带的后端在腹部中段向内折弯，成短黑横带，其端部后延，在最后一腹节中形成亚三角形大黑斑；腹部近后端生殖囊前的区域为宽黑横带，带的侧端在侧缘处向前扩展。雄虫生殖囊淡黄白，囊的腹面中央黑色，呈大斑状。

量度 (mm): (♂) 体长 9.0, 体中段宽 1.35。头长 0.18, 头宽 1.35, 头顶宽 0.55。触角各节长 1.93:2.93:?:?。前胸背板长 1.35, 后缘宽 2.18。革片长 4.2, 楔片长 1.50。(♀) 体长 10.2, 体宽 2.1 (Carvalho, 1979)。

模式标本: 正模♀, 台湾南投县茅埔 (存 MZHF) (未检查)。

观察标本: 1 ♂, 广西防城垌中乡, 550m, 2000.VI.5, 李文柱采。

分布: 广西、台湾。

8. 毛盾盲蝽属 *Onomaus* Distant, 1904

Onomaus Distant, 1904d: 416. **Type species:** *Onomaus pompeus* Distant, 1904; by original designation.

体狭长，中大型，两侧平行。

头相对较小，侧面观几垂直，背面观额略下倾，额前缘宽圆，额区可见两侧的斜列平行横纹的痕迹；头顶相对较平，中纵沟明显，后缘无嵴，颈常露出；眼后缘远离领。头侧面观额与唇基间具浅横缢，唇基较低，基部尤为平缓；上顎片长三角形，相对较饱满隆出，基部较明显；下顎片范围宽大，向下伸达小颊。头前面观眼前部分相对狭长，仅略短于眼长；触角窝大体位于眼内缘的下半，但似略偏高，上缘略在眼内缘中点之上。触角细长，第Ⅰ节甚细长，远长于头宽，向端微渐加粗；第Ⅱ节细长，亚线形，向端微加粗；第Ⅲ、Ⅳ两节长，线形。

领明显，粗，无光泽，具若干直立毛。胝略高于领，明显低于盘域；胝略拱隆，后部界限明显，前伸达领，侧方伸达背板侧缘，有光泽；胝与胝间区之间的界限可以看出，胝间区狭窄，长约为胝长的 $2/3$ ，高度约同胝；盘域明显拱隆饱满，光泽弱，具极稀的浅横皱，皱纹以外可见隐约的浅刻点状凹痕；侧缘侧面观前段具一低细棱嵴，其余部分钝圆，侧缘背面观在胝与盘域间凹弯，盘域侧缘背面观较直，后侧角较钝。

小盾片整体肿胀，隆升甚高；其后的端角区域低平，与半鞘翅大体平齐；侧缘具刻点列，略呈皱刻状，可因小盾片肿胀而从背面不能看到；毛稀长，直立，细刚毛状。中胸盾片部分露出。

爪片不透明，具直立长毛，细刚毛状，外缘具一系列刻点。革片及楔片半透明，毛被均短小，半平伏，淡色刚毛状；革片外缘具一系列刻点；缘片狭窄，具毛。

足细长，后足股节下方具较多的直立细毛，后足胫节刺淡色，基部无黑色小点斑。跗节第Ⅰ跗分节甚短，第Ⅱ、Ⅲ两节约等长。

世界已知4种，东洋界分布，本书记载3种，包括1个新种。

种 检 索 表

- 1. 前胸背板胝具瘤突；胝的前、后缘具明显刻点列 狭毛盾盲蝽，新种 *O. tenuis* sp. nov.
前胸背板胝一般，无瘤突；胝的前、后缘无刻点列 2
- 2. 雌虫触角第Ⅱ节黑褐，中段具黄色宽环。革片大斑内角无黄白色小圆斑
..... 秀色毛盾盲蝽 *O. coloratus*
雌虫触角第Ⅱ节全黑，或基段锈褐。革片大斑内角具一黄白色小圆斑
..... 美丽毛盾盲蝽 *O. lautus*

(11) 秀色毛盾盲蝽 *Onomaus coloratus* Zheng et Liu, 1992

Onomaus coloratus Zheng et Liu, 1992: 298, 305; Schuh, 1995: 682; Kerzhner & Josifov, 1999: 204.

与 *O. lautus* 相似，体较狭而总体色较淡而明亮。

头全部淡污黄褐色，或底色大部污黄褐，中纵带及由中纵沟前端伸达触角窝的斜带黑褐色，头顶后部、眼后、颈、唇基、上颚片、由下颚片下缘后延的纵纹、以及头下方黑褐色；或头的前部、侧面以及下方全部黑色。触角相对更长，第Ⅲ、Ⅳ节尤甚；两性第Ⅰ节均为淡红褐色；雌虫第Ⅱ至Ⅳ节黑褐色，第Ⅱ节中段略偏基方有一淡色宽环，第Ⅲ节基半黄白；雄虫第Ⅱ至Ⅳ节全部黑色；触角毛被似 *O. lautus*。

领毛远为短小，较稀；领背面淡黄褐，侧面及腹面黑色。胝背面全部及胝间区均为淡色，几无深色斑纹。盘域色斑与 *O. lautus* 相似，但基部中央黑斑较小；淡色个体盘域可很淡，几无深色斑纹可辨，只在侧缘前部胝外缘处的纵带为黑色。

小盾片与 *lautus* 相似，但肿胀隆起程度略低，肿胀部分的后端略成三角形；侧缘黑斑略狭，侧缘刻点列由背面可见。爪片锈褐或棕褐色，外缘及内缘常宽阔地深黑褐色，基段黑褐；革片亚基部无黑斑，中段大斑前缘向后凹弯，外半成不宽的斜带状，伸达革片外缘，斑的中心部分常成锈褐色，斑的内角不含小白圆斑，斑的内后角区域不含卵形斜列淡斑；革片端缘及缘片端区黑褐色。膜片后端烟黑色大斑中常有1小白圆斑。

前、中足股节前半具2个明显的淡红色宽环，后足股节全长具3个明显的淡红褐色宽环，后足胫节底色淡，整个基段淡红或亚基段具隐约淡红色宽环，中央偏端方为1淡黑褐色宽环，再后为黄白色，末端淡黑褐；或后足胫节前2/3全黑，其后为黄白色。

淡色个体体下全部淡黄，深色个体前胸侧板黑褐，腹下灰褐色，斑驳，部分具粉