

17. 体色斑为黑白二色, 界限明显。小盾片饱满, 略隆起。触角第Ⅱ节向端渐粗, 略扁 贝盲蝽属 *Bertsia*
 18
 色斑非为黑白二色。小盾片一般。触角线形或向端加粗, 但不扁 18
18. 前胸背板无毛 萨盲蝽属 *Sabactiopus*
 前胸背板具毛 19
19. 头顶无(或几无)中纵沟 20
 头顶有一短而浅的中纵沟 厘盲蝽属 *Liistonotus*
20. 胫节刺褐色, 刺基无小黑点斑。头的眼前部分较短小, 形状一般 始丽盲蝽属 *Prolygus*
 胫节刺黑色, 刺基具小黑点斑。头的眼前部分呈粗壮拱隆的锥形 光盲蝽属 *Chilocrates*
21. 小盾片上的毛直立, 或略向后倾 奥盲蝽属 *Orthops*
 小盾片上的毛平伏或半直立 22
22. 左阳基侧突感觉叶表面具若干短棘刺。前胸背板刻点粗大。后足膝部常有一深色斑 23
 左阳基侧突感觉叶表面无短棘刺。前胸背板刻点大小中等 24
23. 胫节刺黑色。前胸背板较平, 前倾程度较弱。小盾片较平 草盲蝽属 *Lygus*
 胫节刺黄褐色。前胸背板饱满拱隆, 前倾明显。小盾片隆起。半鞘翅具平伏丝光毛丛
 拟草盲蝽属 *Cyphodemidea*
24. 喙仅伸达中胸腹板中央 拟壮盲蝽属 *Paracyphodema*
 喙至少伸达中足基节 25
25. 领白色或黄白色, 与体色有较明显的反差 26
 领非为白色或黄白色, 或与淡色的身体一色而无反差 28
26. 前胸背板侧缘略凹弯。爪下无爪垫。领具多行刚毛状毛及若干微毛(trichomae)
 水杉盲蝽属 *Metasequoiamiris*
 前胸背板侧缘直或微拱弯。具爪垫 27
27. 半鞘翅侧缘几直, 两侧缘几平行。体较小而相对狭长。后胫刺一般 松盲蝽属 *Pinalitus*
 半鞘翅侧缘略拱弯。后胫刺大而明显 木盲蝽属 *Castanopsides*
28. 体黑褐, 较长大, 光泽强。头顶后缘无嵴或只两端具嵴。前胸背板后缘狭细地黄白色, 刻点深浅不一且不规则 树丽盲蝽属 *Arbolygus*
 体色较淡, 黄褐色, 绿色或褐色 29
29. 体背面具银白色平伏丝状毛 泰盲蝽属 *Tailorilygus*
 体背面无银白色平伏毛 30
30. 头顶后缘全长具嵴或至少两端具嵴。小盾片不隆起或隆起不明显 31
 头顶后缘完全无嵴。体较宽, 长椭圆形。小盾片明显隆起。阳茎端无针突
 拟丽盲蝽属 *Lygcorides*
31. 左右阳基侧突感觉叶均具瘤状或指状突起。阳茎端端具“锉叶”及“箍骨片”
 新丽盲蝽属 *Neolygus*
 左右阳基侧突感觉叶无瘤状或指状突起。阳茎端无“锉叶”及“箍骨片” 32
32. 阳茎端无针突。阳茎端鞘不摊开, 阳茎端长筒形。全体绿色 硕丽盲蝽属 *Macrolygus*
 阳茎端针突发达 33
33. 体较狭长。头顶中纵沟两侧区域具极细小的网格状微刻。阳茎端除针突外, 无其他明显的针刺状

- 骨化附器 丽盲蝽属 *Lygocoris*
- 头顶中纵沟两侧区域多光滑, 无小网刻状微刻。阳茎端除针突外, 尚具其他明显的针刺状骨化附器 34
34. 阳茎端具 2 根针突状骨化附器, 常或多或少被一槽状骨片所包围 异丽盲蝽属 *Apolygopsis*
- 阳茎端只具 1 根针突 后丽盲蝽属 *Apolygus*
35. 体毛二型: 具黑色刚毛状毛及金黄、黄褐或淡色略宽扁的鳞状毛 36
- 体毛一型 46
36. 领粗, 直径约等于胫长。体厚实。触角第 I、II 节常粗大或成扁叶状 37
- 领细, 直径远小于胫长 39
37. 触角第 I 节扁叶状。触角与复眼之间有一漆黑色的丝绒状斑 厚盲蝽属 *Eurystylus*
- 触角第 I 节圆柱形, 不成扁叶状。触角与复眼之间不具漆黑色的丝绒状斑 38
38. 小盾片较强烈地隆起。头顶后缘不具明显的隆嵴 拟厚盲蝽属 *Eurystylopsis*
- 小盾片较平, 隆起不明显。头顶后缘具明显而较粗的隆嵴 缘顶盲蝽属 *Eurystylomorpha*
39. 后足股节长, 常略扁, 伸过腹部末端 植盲蝽属 *Phytocoris*
- 后足股节不伸过腹部末端 40
40. 头顶具中纵沟 41
- 头顶无中纵沟 44
41. 前胸背板侧缘具棱边。额向前伸出 42
- 前胸背板侧缘一般, 不具棱边 43
42. 头垂直。前胸背板后侧角伸出并略上翘 延额盲蝽属 *Pantilius*
- 头斜下倾。前胸背板后侧角伸出不显, 不上翘 乌毛盲蝽属 *Cheilocapsus*
43. 触角第 I 节内侧无较大而明显的黑色刚毛状毛。喙不伸达中足基节 混毛盲蝽属 *Heteropantilius*
- 触角第 I 节内侧具 1 根或数根较大的黑色刚毛状毛。喙伸过中足基节 苜蓿盲蝽属 *Adelphocoris*
44. 两性均为长翅型 45
- 雌虫亚短翅, 膜片退化。雄虫长翅。后足股节伸长 拟植盲蝽属 *Phytocoridea*
45. 触角第 II 节至少端部黑色; 如全为淡色, 则喙伸达或伸过中足基节 俊盲蝽属 *Closterotomus*
- 触角第 II 节淡色。喙不伸达中足基节 罗盲蝽属 *Reuterista*
46. 体具黑色毛 47
- 体毛淡色, 无黑毛 50
47. 头顶后缘或后缘前方在眼内侧有横嵴, 向中渐弱。触角第 I 节短, 不伸过头端 间嵴盲蝽属 *Dichrooscytus*
- 头顶后缘或后缘前方无横嵴。触角第 I 节伸过头端 48
48. 前胸背板侧缘棱边状 49
- 前胸背板侧缘不具棱边。体黄绿色, 有明显黑纹 纹翅盲蝽属 *Mermitelocerus*
49. 体绿色, 一色或几为一色。领远细于胫 肩盲蝽属 *Allorhinocoris*
- 体红、黑二色。毛直立。领粗, 直径约同胫长 粗领盲蝽属 *Capsodes*
50. 爪片具刻点 51

爪片无刻点 52

51. 爪片具一纵列刻点 刻爪盲蝽属 *Tolongia*

爪片遍布刻点 短鞘盲蝽属 *Brachycoleus*

52. 第 I 跗分节长为第 II 节的 1.5~2 倍 纤盲蝽属 *Stenotus*

第 I 跗分节不长于第 II 节 53

53. 半鞘翅上翅脉的两侧成明显的黑纹状 54

半鞘翅翅脉两侧不成黑色 55

54. 前胸背板侧缘成明显的薄边状..... 棱缘盲蝽属 *Paramiridius*

前胸背板侧缘不成薄边状 杆盲蝽属 *Rhabdomiris*

55. 头顶具中纵沟。触角常长于身体 56

头顶中纵沟几不可辨或无 遮颜盲蝽属 *Loristes*

56. 领细，细于触角第 II 节基部的直径 沟顶盲蝽属 *Megacoelum*

领不细于触角第 II 节基部的直径 57

57. 胫节刺黑色 东盲蝽属 *Orientomiris*

胫节刺褐色或淡色 58

58. 前胸背板侧缘棱边状。额伸出于唇基之上 耳盲蝽属 *Cheilocapsidea*

前胸背板侧缘一般，不成棱边状 59

59. 喙伸过后足基节。阳茎端膜叶总体配置大体左右对称 淡盲蝽属 *Creontiades*

喙不伸过后足基节。阳茎端膜叶总体配置明显左右不对称。雄虫次生生殖孔围以膜质的毛状构造
..... 帕盲蝽属 *Poppiocapsidea*

12. 苜蓿盲蝽属 *Adelphocoris* Reuter, 1896

Adelphocoris Reuter 1896a: 168. **Type species:** *Cimex seticornis* Fabricius, 1775; by original designation.

Trichophoroncus Reuter, 1896a: 168. **Type species:** *Calocoris albonotatus* Jakovlev, 1881; by original designation. Synonymized by Josifov & Kerzhner, 1972: 164.

Fulgentius Distant, 1904a: 103. **Type species:** *Fulgentius mandarinus* Distant, 1904; by monotypy. Synonymized by Carvalho, 1952a: 93.

中大型，较狭长，两侧较平行或成长椭圆形。

头多斜下倾，额-头顶区均匀饱满，头顶中纵沟甚浅，少数种类略深，前、后端有时可见向两侧分歧；后缘无隆嵴，多具数对较大型的长刚毛状毛，有时直立。额区两侧成对平行斜纹不明显或成褐斑状；头部背面毛全部刚毛状或另具闪光丝状毛。额与唇基间具宽浅横凹槽；上颚片三角形，基部区域具若干直立长毛，其中部分常成黑色粗刚毛状；下颚片长于上颚片。眼背面观多呈横列状，后方常不接触前胸背板。前面观头的眼前部分长约为其余部分之半，触角窝位于眼内缘的下半，下端不达眼的下端。侧面观眼下端远离头的下缘。触角细长，各节为粗线形；第 I 节毛平伏，黑色，较短密，内侧亚端段及中段常各有 1~3 根较粗大而斜伸的黑色刚毛状毛，其余各节毛细小而密。

前胸背板前倾及拱隆程度较弱 (*A. albonotatus* 除外)；领明显，具若干较强劲的