

直立毛以及弯曲或半平伏的淡色闪光丝状毛。胝较平或微隆起，具毛或光滑，无刻点，前半相连，外侧伸达背板侧缘；前胸背板毛二型，刚毛状毛遍布，闪光丝状平伏毛限于前半，在许多种类中极不显著；胝前区具数对直立长毛，刚毛状，前侧角处的一根斜外伸，明显；侧缘圆钝，直；后缘较直；盘域刻点浅，较稀，并可呈粗横皱状。小盾片较平，具浅横皱，毛被多同半鞘翅。半鞘翅毛二型，包括淡色闪光丝状平伏毛与较直的刚毛状毛。

足股节相对较细，具多数深色小斑排成数纵行，被较密的深色平伏小毛及较少数的黑色强劲的刚毛状毛，毛基常具小黑斑。胫节刺黑色，强劲而显著。后足跗节第 I 节最短，第 III 节最长。

腹下亚侧区各节具一下凹的小斑，其表面光滑，常色较深。

雄虫载肛突左侧抬升，成压扁的锥状，色深而骨化强。两侧阳基侧突着生处的前方不远各有一垂直的小尖突，左侧者较细长显著，右侧者短小。阳基侧突一般细长，基部略粗，左侧者常弯曲，杆的端部略似鹅头状；右侧者端部有一弯曲的钩状或叉状突起。阳茎鞘为一狭长的帽状，未膨胀时包裹于整个阳茎端的端方大部分，其端部裂成两片，包于梳状骨板之外。阳茎总体较为狭长，导精管两侧骨化强，腹面似骨化弱，其端方具可以膨胀的膜囊；次生生殖孔开口骨化较弱，以致不甚显著，孔的背方右侧连接一较大的梳状骨板 (comb-shaped spiculum)，板的一侧端方具两排大齿，基方具一排齿；次生生殖孔的左侧背方着生一较小细长弯钩状的针突状骨化附器，其基部外侧有一明显但不甚大的膜囊相连。

各大动物地理分布区均有记录。但大部分种类分布于古北界温带及寒温带。多生活于草本或灌木上，个体数常多，是盲蝽亚科在我国北方最常见的属之一。有些种类间的界限不易判断。世界已知 50 余种，本书共记载 28 种。

附记：本书作者认为 *A. piceosetosus* Kulik, 1965 极可能为 *A. rufescens* Hsiao 1963 的次异名，但尚待进一步确证。因此本书中 *piceosetosus* Kulik 项不作描述，分种检索表中与 *rufescens* 并列。

种 检 索 表

1. 体黑，革片有白色横带或斜纹 2
 身体色斑不若上述 3
2. 体略呈束腰状。革片基半具白色横带，带的前缘几平，后缘斜 白纹苜蓿盲蝽 *A. albonotatus*
 体不呈束腰状。革片沿爪片缝具白色斜纹，向后渐尖 斜斑苜蓿盲蝽 *A. obliquefasciatus*
3. 小盾片中线两侧各有一深色纵带。体黄褐，前胸背板盘域有一对黑色圆斑 4
 小盾片不若不述 6
4. 革片后半及外半刚毛状毛黑褐色。胝前及胝间区具明显闪光丝状平伏毛。股节深色点斑细碎，排列不规则 西藏苜蓿盲蝽 *A. tibetanus*
 革片刚毛状毛淡色或黄褐色 5

5. 体较小, 长 6.5~8.1mm。头宽:前胸背板宽 = 1:1.6。头背面常有深浅不一的“X”形斑。胝前区大毛黑色。干标本身体底色黄褐 小苜蓿盲蝽 *A. ponghvariensis*
 体大, 体长 6.7~9.0mm。头宽:前胸背板宽 = 1:2。头背面“X”形斑不明显。胝前区大毛淡色。干标本身体底色淡污黄褐色 苜蓿盲蝽 *A. lineolatus*
6. 前胸背板盘域前及盘域全黑, 或盘域具黄褐中纵带, 或只盘域前半具淡色中纵带, 或前、后缘或只后缘狭窄地淡色 7
 前胸背板盘域前非全部黑色, 或只胝区黑色, 或盘域前部淡色, 或整个前胸背板淡色或色较淡 11
7. 触角第 II 节全黑 8
 触角第 II 节只端半或端部黑色 10
8. 触角第 III、IV 节基部黄白色。臭腺沟缘全部黄白色。前胸背板盘域无黄褐中纵带 横断苜蓿盲蝽 *A. funestus*
 触角第 III、IV 节一色或基部深。臭腺沟缘前半黑, 后半黄白。前胸背板盘域可有淡色中纵带、斑 9
9. 触角第 I 节黑。革片基半沿中裂常成淡色斜带。前胸背板前部闪光丝状平伏毛发达, 显著, 其分布向后达于盘域前部 原苜蓿盲蝽 *A. seticornis*
 触角第 I 节锈褐色。革片几一色, 基半无淡色斜带或淡色区域。前胸背板前部闪光丝状平伏毛较不发达, 分布不达盘域 黑苜蓿盲蝽 *A. tenebrosus*
10. 前胸背板胝前部分及领黄色。小盾片中央略隆出。雄体向后略加宽 淡须苜蓿盲蝽 *A. reicheli*
 前胸背板只后缘狭窄地淡色, 领黑色。小盾片平。雄体形状正常 远东苜蓿盲蝽 *A. laeviusculus*
11. 前胸背板后半具黑色横带(完整或断续)或 2~4 个黑色斑 16
 前胸背板一色淡色; 或二胝后各有一黑色圆斑; 或二胝与胝间相连部分黑色 12
12. 前胸背板一色淡色, 无黑斑 14
 前胸背板底色淡, 二胝与胝间相连部分黑 13
13. 前胸背板二胝后各有一黑色圆斑。爪片内半或全部、以及小盾片黑。体底色污黄或黄绿 中黑苜蓿盲蝽 *A. suturalis*
 前胸背板二胝后无黑色圆斑。二胝与胝间相连部分黑 黑胝苜蓿盲蝽 *A. torquatus*
14. 小盾片无深色中纵纹带。体背面无黑褐色毛 15
 小盾片具一黑褐色明显中纵纹带。头及身体背面具大量显著黑褐色刚毛状毛 中纹苜蓿盲蝽, 新种 *A. medialis* sp. nov.
15. 唇基端部色常加深成深褐或黑褐色。胝及盘域前部无或几无闪光丝状平伏毛 黑唇苜蓿盲蝽 *A. nigritylus*
 唇基一色, 端部不加深。前胸背板前半闪光丝状平伏毛分布包括胝及盘域前部 污苜蓿盲蝽 *A. luridus*
16. 前胸背板胝、胝前区、胝间区及盘域前部具多数明显的闪光丝状平伏毛 17
 前胸背板胝、胝前区、胝间区及盘域前部闪光丝状平伏毛甚少, 不明显, 或无 20
17. 头部毛细, 淡色刚毛状, 无明显的狭鳞状闪光丝状毛。前胸背板领上的大型刚毛状毛明显, 淡色