

后部较显，毛近平伏，短，较密，均匀遍布。小盾片具浅密横皱，基部黄色。半鞘翅毛同前胸背板，革片毛略长，楔片毛同革片；膜片淡烟色，脉色灰绿。

体下及足黄褐。后足股节除背面具黑毛外，腹面亦遍布黑毛；后足胫节刺黑，长约为该胫节直径之半。

量度 (mm): 体长 9.14, 体宽 2.75。头长 0.65, 头宽 1.08, 头顶宽 0.54。触角各节长 1.35: ? : ? : ?。前胸背板长 1.05, 后角间宽 1.94。革片长 4.88, 楔片长 1.68。

观察标本: 1 ♂, 新疆哈巴河铁烈克提, 1975.VIII.13。

分布: 新疆; 欧洲, 俄罗斯 (西伯利亚、远东), 哈萨克斯坦。

(48) 斑角肩盲蝽, 新种 *Allorhinocoris splendidus* Zheng sp. nov. (图 23)

体长椭圆形, 两侧平行程度较弱。身体二色。

头斜前伸, 一色淡黄褐; 额-头顶区低平; 额两侧的平行横纹较明显; 唇基背面观较粗, 端部钝圆。触角窝缘背面红色; 触角第 I 节黑褐; 第 II 节向端渐加粗, 不成亚线形, 深锈红褐色, 端部约 1/5 黑褐。喙短, 只伸达后足基节基端。

前胸背板绿色, 具光泽; 领灰绿, 无光泽; 胝黄, 界限甚明显, 较横宽, 侧端伸达背板前角处的棱边, 各胝后缘近侧端向外方伸出成一尖突状, 二胝前半在背板中央相连, 胝间区后的盘域成三角形前伸。前胸背板前缘微向后凹弯, 前角侧方超出领侧端以外, 较圆钝, 前伸不显, 达于领长之半处; 侧缘直, 边缘几不扁薄, 略可看出成隐约的棱边状, 后角略成直角状, 但末端尚不成尖角, 略钝; 后侧角处偏前有一纵走短黑斑, 后端刚伸过角端; 后缘中央略前凹; 盘域相对饱满, 具明显深皱刻, 似 *A. virescens*, 皱刻分布达于侧缘; 毛被短小平伏, 色淡, 为淡褐色, 明显淡于我国其余种类。

小盾片较饱满, 绿色, 中纵线淡黄色, 具横皱; 毛被同半鞘翅。中胸背板外露较多, 污黄褐色。

半鞘翅几无光泽; 爪片及革片大部锈褐色或暗红褐色, 缘片、革片外缘区域与楔片绿色, 楔片末端狭窄地红黑色; 毛被与我国其他种类相似, 但略短细, 而色较淡, 同时爪片与革片内侧的部分毛呈现为略弯曲而具闪光的平伏丝状毛。膜片烟褐色, 脉红色。

体下淡黄褐, 足淡棕褐色; 后足股节黑毛色较淡, 向腹面渐成白色; 后足胫节红, 胫节刺淡色。

雄虫生殖囊开口在左阳基侧突前方有一低钝的小突起 (我国其他已知种则无)。

量度 (mm): 体长 8.9, 体宽 3.25。头长 0.43, 头宽 1.18, 头顶宽 1.60。触角各节长 1.0: 2.75: ? : ?。前胸背板长 1.13, 后角间宽 2.68。革片长 4.1, 楔片长 1.83。

种名词源: 拉丁文 *splendid-*, 意为“光明、灿烂”, 指新种体色明丽。

模式标本: 正模 ♂, 四川峨眉山报国寺, 600m, 1957.V.7, 郑乐怡、程汉华采。

分布: 四川。

新种与属内其他种的区别见检索表。




图 23 斑角肩盲蝽, 新种 *Allorhinocoris splendidus* Zheng sp. nov.

a. 体背面观 (dorsal view of body); b. 前胸背板右半 (right half of pronotum); c. 雄生殖节左侧 (left side of male genital segment)。

(49) 尖角肩盲蝽 *Allorhinocoris virescens* (Poppius, 1915) (中国新记录种)

Calocoridea virescens Poppius, 1915b: 40.

Allorhinocoris virescens Carvalho, 1959: 27; Schwartz, Asquith & Lattin, 1989: 366; Schuh, 1995: 699.

长椭圆形, 体较前两种宽大, 几无光泽。毛较前两种略短。

绿色, 头部、前胸背板前部及侧缘区、小盾片、半鞘翅外侧区与基部、以及楔片常为黄绿或淡黄褐色。

头较短, 额-头顶区斜前伸, 略下倾, 较短, 额区两侧的平行横纹较清楚, 同底色; 头顶相对较前两种为宽, 头顶宽与眼宽之比为 1:0.68 (♂) 或 1:0.75 (♀); 中纵沟后端远离头后缘, 沟后半两侧的微刻区近似前弯的宽弧形。头后缘以后的颈部黑色, 露出时呈黑横带状。触角第 I 节淡黄褐至淡污锈褐色, 两端黑褐色, 被较长的黑色刚毛状毛, 密度中等, 半平伏; 第 II 节向端渐粗, 不成细线形, 红褐至锈褐色, 基部 1/4~1/2 开始向端渐深, 成黑色, 毛短小, 长度不甚均一, 略呈蓬松状, 淡褐色, 半平伏;