

雌性外生殖器：环骨片肾脏形，向中央渐狭尖，骨化较弱。交配囊后壁侧叶于中央左右分离；背结构常为圆形；中突近圆形；支间叶狭小，为细小的管状，末端常圆钝，略膨大，表面具刺。

Apolygus 属的种类寄主范围较广，有杨柳科、薔薇科、榆科等木本植物，亦有蓼科、菊科、荨麻科等草本植物。

绿后丽盲蝽 *A. lucorum* 危害棉花、大豆、花生等，枣后丽盲蝽 *A. zizyphi* 在枣树花期取食枣花，可造成严重危害。

全北区及东洋区分布。全世界已记载 40 余种。我国已知 28 种。

本属原作为 *Lygus* 属的亚属建立 (China, 1941)，后来在 *Lygocoris* 属的概念定型后，移入后者为其亚属之一。Clayton (1981) 曾在其硕士论文中建议将 *Lygocoris* 属的 3 个亚属 [*Lygocoris* (s. str.)、*Neolygus* 和 *Apolygus*] 分别提升为属，但此一建议并未发表。Miyamoto (1987) 正式提出将 *Apolygus* 提升为独立的属，现已得到较普遍的承认 (Josifov et Kerzhner 1999 等)。

附记：据 Kerzhner & Josifov (1999)，此属的 *A. rhamnicola* (Reuter, 1885) 中国分布记录 (内蒙古) 为误定。

种 检 索 表

1. 嗉较长，至少伸达后足基节中央 2
- 喙较短，仅伸达或略伸过中足基节 23
2. 嗉明显伸过后足基节，可达生殖节 枣后丽盲蝽 *A. zizyphi*
- 喙不明显伸过后足基节 3
3. 体绿色、淡绿或黄绿色，前胸背板、爪片及小盾片均无深色斑纹 4
- 体不为绿色或黄绿色，否则前胸背板、爪片或小盾片具深色斑纹 7
4. 楔片末端黑色 5
- 楔片末端同体色，不成黑色 6
5. 缘片端部深色；革片末端具深色斑；胫节刺基部具小黑点斑 皂荚后丽盲蝽 *A. gleditsiicola*
- 缘片与革片端部无深色斑；胫节刺基部无小黑点斑 斯氏后丽盲蝽 *A. spinolae*
6. 胫节基部黑褐色 大后丽盲蝽 *A. major*
- 胫节全部淡色，基部不成黑褐色 绿后丽盲蝽 *A. lucorum*
7. 小盾片单一黑色，或有褐色至黑色斑纹 8
- 小盾片单一淡色，无深色斑纹 15
8. 小盾片单一黑色或黑褐色 9
- 小盾片非为单一黑色，具褐至黑褐色斑纹 10
9. 脐具黑斑。革片大部黑或黑褐 东方后丽盲蝽 *A. eous*
- 脐无黑斑。革片仅内半为黑色 中黑后丽盲蝽 *A. medionigritus*

10. 脾具黑斑.....	11
脾无黑斑.....	14
11. 小盾片基部具三角形黑斑	12
小盾片基部不具三角形黑斑	13
12. 小盾片基部黑斑大，约为等边三角形	斑盾后丽盲蝽 <i>A. nigrocinctus</i>
小盾片基部黑斑小，不为等边三角形	台湾后丽盲蝽 <i>A. kosempoensis</i>
13. 小盾片中央有一黑褐色纵带	宝岛后丽盲蝽 <i>A. fuhoshoensis</i>
小盾片中央有一“人”字形黑斑，斑的两分岔下垂，不上翘。前胸背板盘域褐色	毛后丽盲蝽 <i>A. sinicus</i>
14. 小盾片中部有一褐色箭头状大斑。前胸背板后半有一“山”字形（雄）或两个“U”形（雌）斑....	箭斑后丽盲蝽 <i>A. wangii</i>
小盾片仅基部深色。前胸背板近侧缘橙红色。整个缘片黑色.....	黑缘后丽盲蝽 <i>A. nigricostalis</i>
15. 爪片全为黑色.....	16
爪片非全部黑色.....	19
16. 前胸背板几全为黑色，仅前缘至两脾有一三角形黄褐斑	角斑后丽盲蝽 <i>A. concinnus</i>
前胸背板盘域全部或前半淡色，脾前中央无三角形黄褐斑	17
17. 触角第II节基部和端部 1/3~2/3 黑色	18
触角第II节基部不为黑色，仅端部为黑色	美丽后丽盲蝽 <i>A. pulchellus</i>
18. 前胸背板后缘区有一黑横带伸达后侧角。后足胫节直	斑后丽盲蝽 <i>A. ornatus</i>
前胸背板后缘区无黑横带。后足胫节弯曲	弯胫后丽盲蝽 <i>A. curvipes</i>
19. 触角第I节端部黑褐色。革片端部黑褐色范围可达革片长一半以上	异色后丽盲蝽 <i>A. hilaris</i>
触角第I节端部与不成黑褐色。革片端部黑褐色范围较小.....	20
20. 唇基仅末端黑褐色.....	21
唇基全部黑色.....	22
21. 爪片黄褐色	三角后丽盲蝽 <i>A. triangulus</i>
爪片黑，仅外缘淡色	双环后丽盲蝽 <i>A. biannulatus</i>
22. 上颚片红色。缘片外缘黑色，楔片内缘红色	褐后丽盲蝽 <i>A. castaneus</i>
上颚片不为红色。缘片外缘不为黑色，楔片内缘不为红色	榆后丽盲蝽 <i>A. ulmi</i>
23. 体背面单一黑色	黑后丽盲蝽 <i>A. nigricans</i>
体背面非单一黑色	24
24. 小盾片全黑	狭后丽盲蝽 <i>A. angustus</i>
小盾片底色淡，可有深色带纹	25
25. 小盾片中央有一条贯全长的褐色纵中纹	郑氏后丽盲蝽 <i>A. zhengianus</i>
小盾片一色淡色	26
26. 头前半或唇基黑色	27
头一色淡色，前部无深色部分	丝棉木后丽盲蝽 <i>A. evonymi</i>
27. 头前半全黑。爪片除基部外，全为黑色	海南后丽盲蝽 <i>A. hainanensis</i>