

**模式标本：**正模♂，北京西山，1957.VIII.2，应松鹤、李绍华采（存NKU）（已检查）。

**观察标本：**1♂（正模），北京西山，1957.VIII.2，应松鹤、李绍华采；1♂，北京西山，1957.VIII.31，应松鹤、李绍华采；1♀（配模），河南安阳，1954.VIII；2♂♂（副模），同前；1♀，湖北武昌珞珈山，1957.VIII.3，应松鹤采。

**分布：**北京、河南、湖北。

### （81）箭斑后丽盲蝽 *Apolygus wangii* (Kerzhner et Schuh, 1995) (图 50)

*Lygus (Apolygus) signatus* Zheng et Wang 1983a: 48, 56 (junior homonym of *Lygus cervinus* f. *signata* Stichel, 1930).

*Lygocoris (Apolygus) signatus* (Zheng et Wang): Lu et Zheng, 1996: 136.

*Lygocoris (Apolygus) wangii* Kerzhner et Schuh 1995: 3.

*Lygocoris wangii* Kerzhner et Schuh: Schuh 1995: 806.

*Apolygus wangii* (Kerzhner et Schuh): Kerzhner & Josifov, 1999: 68.

体长椭圆形，两侧近平行。底色污黄褐或黄褐色，具污黑褐斑。

头垂直，污黄褐或淡污褐；唇基全部黑褐；上唇黑；额前方中部常渐成黑褐色，有时额区可见若干成对的平行横纹的痕迹，或无。头顶与复眼的宽度比为1.2:1，部分个体头顶中纵沟两侧区域沿沟后臂前方有一小网格状微刻区，横列；头顶后缘嵴微前拱，嵴细，简单，或中段在嵴后有一低平区。头前面观眼前部分长等于眼下缘至触角窝上缘间的距离；下颚片外缘成低平的弧形，整体斜行。侧面观头高:眼高=4:2.5。触角同体色；第Ⅱ节末端黑色，第Ⅲ、Ⅳ节黑褐，第Ⅲ节基部一狭环淡黄色；第Ⅱ节长度与前胸背板基部宽度之比为1:1.25。喙伸达后足基节末端。

前胸背板相对短宽，向前明显逐渐变狭；拱隆程度相对较弱；侧缘（前端除外）直，后缘中段微向后弧弯。底色黄褐或淡污褐，盘域后半除后缘处淡色外，常为深褐或黑褐色，成一完整宽带，或成4个相连的黑斑状，胝区有时色深。领细，约与头后缘嵴等粗。胝斜列，后内角内伸，胝间区三角形；二胝前半相连，胝亦与胝前区连成一体，前伸达领。盘域刻点相对深大，密度中等略偏稀；毛淡黑褐色，短而半平伏。

小盾片较平，具明显横皱；底色污黄褐，基半具不规则而较破碎的黑褐色云斑，沿小盾片侧缘后半或后方4/5为一黑褐色宽带；或黑斑整个大约成一较破碎的宽“x”形大斑状。爪片大部黑褐，只周缘及爪片脉淡色；或整个爪片外半（包括爪片脉在内）均为淡色。革片中裂内侧的前半成淡黑褐色晕斑状；革片后端黑色，黑色区域或成山峰状向前折弯的宽横带状（折弯顶端位于中裂处），或此带前伸的部分向两侧扩展成不规则的斑块状，斑带内半均后伸几占据整个“副楔片”；斑的外侧则可沿缘片内缘前伸渐细，达革片的前1/5处。爪片与革片刻点较细密，不甚规则；毛较细短，较密。楔片末端黑