

左侧者长且宽，另两个排成一列，端部的较大。阳茎端针突缺；共有4个膜叶，位于中央的膜叶粗短，表面密布骨化的微刺，右侧膜叶端部着生一钩状骨化附器。导精管中部略膨大，次生生殖孔宽阔。

量度 (mm): 体长 8.74, 体宽 3.14。头长 0.49~0.58, 头宽 1.19~1.29, 头顶宽 (♂) 0.31~0.34。触角各节长 0.88~1.02:2.24~2.38:1.36:?. 前胸背板长 1.13~1.22, 后缘宽 2.48~2.52。革片长 3.9, 楔片长 1.49。

模式标本: 正模♂, 西藏吉隆, 2800m, 1976.VII.27, 张学忠采 (存 IZAS) (已检查)。

观察标本: 1♂ (正模), 西藏吉隆, 2800m, 1976.VII.27, 张学忠采; 1♂ (副模), 同前, 1984.VIII.4, 周兆兴采。

分布: 西藏。

本种相似于 *A. pronotalis*, 但身体略带红色, 头顶后缘嵴完整, 头顶较窄, 前胸背板后中域黄褐, 阳基侧突结构非常特殊以及不同的阳茎端结构, 可以区别。

18. 拟猓盲蝽属 *Argenis* Distant, 1904

Argenis Distant, 1904a: 107. **Type species:** *Capsus incisuratus* Walker, 1873; by monotypy.

中小型, 长椭圆形, 相对较狭。与 *Tinginotum Kirkaldy* 属极近似。体亦因具粉被而几无光泽, 具明显的半直立长毛, 眼大而头顶狭窄, 头顶中纵沟明显, 头后缘嵴明显, 领粗而具毛, 领的后缘具深大刻点列, 前胸背板具刻点, 半鞘翅则无刻点, 缘片内缘以及爪片沿内缘各具一系列整齐的刻点。

与 *Tinginotum* 区别之处有: 缘片完全半透明, 其内缘的刻点列十分清楚; 爪片沿外缘的刻点列亦很清楚; 体相对狭长而小; 领的后缘无大形的刻点列。进一步的研究将澄清二者的关系。

已知共 2 种, 东洋界分布。我国记录 1 种。

(98) 点缘拟猓盲蝽 *Argenis incisuratus* (Walker, 1873) (图版 III-7)

Capsus incisuratus Walker, 1873: 121.

Argenis incisuratus (Walker): Carvalho, 1959: 28; Carvalho, 1979: 443; Schuh, 1995: 700; Chérot, 1997b: 399; Kerzhner & Josifov, 1999: 70; Zheng & Lu, 2002: 505.

头淡褐至灰褐, 毛短, 淡色, 平伏; 额-头顶区域常有一深褐色中纵纹, 有时不显。眼很大。触角第 I 节淡褐, 其余各节污黄褐而端部渐黑, 或全部黑褐色或黑色, 中段无白环; 第 III 节长, 接近或超过头的宽度。喙伸达中足基节。

前胸背板相对较为狭长，淡褐至灰褐，毛淡色，较短；胫后明显拱隆，刻点明显，较密而均匀；盘域中央（最高点）有一较短的黑褐色或黑色纵斑，前伸接近胫区；盘域后半各侧常有一黑褐色或黑色大斑，此斑亦各可再分为相连的两块，后侧角处有一具光泽（无粉被）的黑褐色或黑色斑块。

小盾片淡褐，端半渐成黄白，刻点较大而密，与前胸背板同，毛淡色，直立。半鞘翅相对较狭，两侧较平行，淡色毛较长，半平伏；缘片黄白或淡黄褐，半透明，其内缘具一列整齐的密刻点；爪片具深色密碎斑，致外观色深；革片内半沿爪片缝具若干大黑斑，革片后半在端角区域前方有一边缘不整的宽横带，端角区域淡白色；楔片淡黄褐色，半透明，端缘黑褐或黑，向端渐加粗；膜片淡灰色，脉色深。

足淡褐，多无明显的深色斑或环，但有时后足股节亚端部可具两个隐约的褐环，中部可有一褐色窄环。胫刺同足色。

雄虫生殖囊在左阳基侧突着生处的前方有一丛密生的短刺。阳茎端无骨化的针突。

量度 (mm): 体长 4.1~4.26, 体宽 1.25。头长 0.35, 头宽 0.90, 头顶宽 0.25。触角各节长 0.58:1.44:0.98:0.46。前胸背板长 0.85, 后缘宽 1.18。革片长 1.88, 楔片长 0.43。

观察标本: 1 ♂, 海南尖峰岭, 1985.Ⅳ.21, 郑乐怡采 (灯诱); 1 ♀, 云南景洪勐宋, 1958.Ⅳ.23; 2 ♂♂ 2 ♀♀, 云南墨江西南 50 公里, 1955.Ⅲ.30, B. 波波夫采; 1 ♀, 同上, 1955.Ⅲ.31, 布希克采; 1 ♂, 台湾南投 Hweishun, 1990.Ⅱ.20, C. S. Tseng 采, 灯诱 (NMNS)。

中国其他记录: 台湾嘉义县大林 (Poppius, 1915)。

分布: 海南、云南、台湾; 斯里兰卡。

19. 隆胸盲蝽属 *Bertsia* Kirkaldy, 1904

Berta Kirkaldy, 1902a: 57 (nom. praeoccu.). **Type species:** *Capsus lankanus* Kirby, 1891; by original designation.

Bertsia Kirkaldy, 1904: 280. New name for *Berta* Kirkaldy, 1902.

体中小型，长椭圆形，厚实，两侧几平行；底色褐或黑色。头及前胸背板光泽较强。毛一型，刚毛状，较细长。

头垂直，侧面观短；背面观头顶短，额区大部为垂直位；前面观头的眼前区较短小。触角窝位于眼内缘下半，上缘在眼内缘中点处，下缘远离眼下缘，背面观不能见。唇基与额间有横缢，约位于触角窝上缘水平。头具光泽，光滑无刻点；额区两侧的平行横纹不能分辨或可见痕迹；头顶宽，中纵沟区域略低，沟明显，沟与眼间在后缘前各侧有一横椭圆形区域，微隆，表面光滑无微刻；头顶后缘锐边状，高出于其后的颈部，具