

采；1♂，云南思茅菜阳河，1500m，2000.V.22，卜文俊采。

分布：浙江、福建、海南、云南。

此种与 *B. lankana* (Kirby) 近似，但体明显较大，雄外生殖器不同，其余区别之处见检索表。与其他已知种相较，体形亦大。

20. 短鞘盲蝽属 *Brachycoleus* Fieber, 1858

Brachycoleus Fieber, 1858: 305. **Type species:** *Lygaeus scriptus* Fabricius, 1803 (= *Brachycoleus decolor* Reuter, 1887); by monotypy.

Trichocalocoris Wagner, 1952: 46, 47 (as subgenus of *Calocoris*; synonymized by Rosenzweig, 1997: 156).

Type species: *Capsus pilicornis* Panzer, 1805; by original designation.

体较大，椭圆形，较宽，较为厚实。底色黄绿，或带有橙、红色色泽；常具鲜明的黑色斑纹。

头较短宽，背面观三角形，额-头顶区均匀饱满。触角窝由背方常不能看见。头顶无中纵沟，后缘无嵴。额前端略突伸于唇基基部之上；额与唇基之间的凹沟较深。唇基与头背面几成垂直，以致背面观唇基不能看见。头侧面观垂直，眼高略大于眼下部分的高度；触角窝几位于眼的下端。头前面观触角窝则明显位于眼下缘的下方。触角第Ⅲ、Ⅳ节较短，第Ⅱ节常长于第Ⅲ、Ⅳ节之和。喙很短，常不伸过中胸腹板。

前胸背板梯形，侧缘圆钝，无棱边。多密被淡色直立、半直立毛。具粗而明显的领。胝界限明显，二胝之间有一下凹的横沟相连，胝侧方伸达前胸背板前侧角。盘域常具横皱及细浅而不显著的刻点。爪片与革片遍布明显的刻点。后足跗节侧面观第Ⅰ节略短于第Ⅱ节，背面观则第Ⅰ节明显短于第Ⅱ节。

阳茎端具一针突以及一分叉的骨化附器，左膜囊顶囊有一具微刺的骨化区 (Rosenzweig, 1997)。

世界已知 9 种 (Rosenzweig, 1997; Kerzhner & Josifov, 1999)。古北界分布。我国已知 1 种。

(101) 短鞘盲蝽 *Brachycoleus decolor* Reuter, 1887 (中国新记录种)

Lygaeus scriptus Fabricius, 1803: 234 (junior primacy homonym of *Lygaeus scriptus* Fabricius, 1794)

Brachycoleus scriptus var. *decolor* Reuter, 1887: 7.

体椭圆形，污黄绿色，有明显黑色斑纹或近一色而斑纹不显 (我国标本属前者)，具光泽。

头底色淡黄褐，背面观中纵线两侧有一对略向外弯的黑色新月形纵带，向后止于头顶中部，向前伸入唇基，止于唇基中段；头后端的颈部黑色。头部毛白色，较密，直