

采; 1 ♂, 云南思茅菜阳河, 1500m, 2000. V. 22, 卜文俊采。

分布: 浙江、福建、海南、云南。

此种与 *B. lankana* (Kirby) 近似, 但体明显较大, 雄外生殖器不同, 其余区别之处见检索表。与其他已知种相较, 体形亦大。

20. 短鞘盲蝽属 *Brachycoleus* Fieber, 1858

Brachycoleus Fieber, 1858: 305. **Type species:** *Lygaeus scriptus* Fabricius, 1803 (= *Brachycoleus decolor* Reuter, 1887); by monotypy.

Trichocalocoris Wagner, 1952: 46, 47 (as subgenus of *Calocoris*; synonymized by Rosenzweig, 1997: 156).

Type species: *Capsus pilicornis* Panzer, 1805; by original designation.

体较大, 椭圆形, 较宽, 较为厚实。底色黄绿, 或带有橙、红色色泽; 常具鲜明的黑色斑纹。

头较短宽, 背面观三角形, 额-头顶区均匀饱满。触角窝由背方常不能看见。头顶无中纵沟, 后缘无嵴。额前端略突伸于唇基基部之上; 额与唇基之间的凹沟较深。唇基与头背面几成垂直, 以致背面观唇基不能看见。头侧面观垂直, 眼高略大于眼下部分的高度; 触角窝几位于眼的下端。头前面观触角窝则明显位于眼下缘的下方。触角第Ⅲ、Ⅳ节较短, 第Ⅱ节常长于第Ⅲ、Ⅳ节之和。喙很短, 常不伸过中胸腹板。

前胸背板梯形, 侧缘圆钝, 无棱边。多密被淡色直立、半直立毛。具粗而明显的领。胫界限明显, 二胫之间有一下凹的横沟相连, 胫侧方伸达前胸背板前侧角。盘域常具横皱及细浅而不显著的刻点。爪片与革片遍布明显的刻点。后足跗节侧面观第Ⅰ节略短于第Ⅱ节, 背面观则第Ⅰ节明显短于第Ⅱ节。

阴茎端具一针突以及一分叉的骨化附器, 左膜囊顶囊有一具微刺的骨化区 (Rosenzweig, 1997)。

世界已知 9 种 (Rosenzweig, 1997; Kerzhner & Josifov, 1999)。古北界分布。我国已知 1 种。

(101) 短鞘盲蝽 *Brachycoleus decolor* Reuter, 1887 (中国新记录种)

Lygaeus scriptus Fabricius, 1803: 234 (junior primacy homonym of *Lygaeus scriptus* Fabricius, 1794)

Brachycoleus scriptus var. *decolor* Reuter, 1887: 7.

体椭圆形, 污黄绿色, 有明显黑色斑纹或近一色而斑纹不显 (我国标本属前者), 具光泽。

头底色淡黄褐, 背面观中纵线两侧有一对略向外弯的黑色新月形纵带, 向后止于头顶中部, 向前伸入唇基, 止于唇基中段; 头后端的颈部黑色。头部毛白色, 较密, 直

立、半直立。触角淡棕褐色；第Ⅰ节略粗于第Ⅱ节，基部前方及外侧各有一小黑斑；第Ⅱ节向端微加粗，端段黑褐色；第Ⅲ节黑色；前两节毛黑色刚毛状。喙伸达前足基节末端或中胸腹板中部。

前胸背板较平置，拱隆饱满程度较弱。领粗，约与触角第Ⅰ节等粗，颜色、光泽与毛被均同盘域。前胸背板具4条黑纵带，外侧一对距外缘内方不远，起自领的后缘，内侧一对前端遮盖胫的内半，向后渐粗，4带均止于距前胸背板后缘不远处。盘域毛直立，白色，长密而较粗；略具浅横皱或不显，刻点多细浅而不甚规则。

中胸盾片中段及两侧黑。小盾片较平，污黄绿色，基部中央黑色，两侧缘狭窄地黑色，整个小盾片淡色部分略成心脏形。表面具浅横皱。爪片内缘全长成黑色纵带状，向后渐细。革片沿爪片缝以及沿中裂内侧各有一黑色纵带，后者向后渐宽成纵长的三角形，其后端折向内方，进入楔片基内角，达于楔片内缘。爪片与楔片密被明显刻点，较均匀整齐；毛淡色，密而较长，半平伏或几乎平伏。楔片除上述基部黑斑外，其余一色无黑斑。膜片烟黑褐色，膜片脉淡黄。

体下方与足淡黄褐。足遍布黑色刚毛状毛。胫节刺黑色，刺基有一小黑点斑。跗节污黑褐色。

量度 (mm): 体长 8.5, 宽 3.1。头长 0.75, 头宽 1.60, 头顶宽 (♀) 0.80。触角各节长 1.0:2.5:0.85:?. 前胸背板长 1.50, 后缘宽 2.88。革片长 4.35, 楔片长 1.50。

观察标本: 1 ♀, 新疆新源, 1988. VII. 26; 1 ♀, 新疆巩乃斯与特克斯交界处, 1991. VII. 20。

分布: 新疆; 哈萨克斯坦, 塔吉克斯坦, 乌兹别克斯坦, 俄罗斯 (西伯利亚、欧洲部分), 高加索地区, 乌克兰, 土耳其, 中欧, 南欧, 立陶宛。

21. 粗领盲蝽属 *Capsodes* Dahlbom, 1851

Capsodes Dahlbom, 1851: 214. **Type species:** *Cimex gothicus* Linnaeus, 1758; by subsequent designation (Stichel, 1936: 341).

体中型。体长椭圆形，光泽弱或几无光泽。

头垂直；额-头顶区微饱满，较平，眼略向两侧伸出，但不具柄，眼后缘远离前胸；头侧面观眼高明显小于眼下高，眼的前、背缘可伸出于额-头顶边缘之外；唇基与额间有一横缢，唇基基部略前隆；头部毛长，直立。触角细长，第Ⅰ节相对较细，微向内拱弯，基部 1/4 最粗，其后略细；第Ⅱ节向端略渐粗，亚棒状；第Ⅲ、Ⅳ两节细线形；第Ⅰ及第Ⅱ节基半除黑褐色的短毛外，尚具少数同色直立长毛，蓬松状。

前胸背板几乎平置，几不或轻微下倾，盘域微饱满；侧缘钝棱边状，侧角宽圆；后缘较平。领很粗，高度与其后的前胸背板平齐，明显粗于触角第Ⅰ节，具长而直立的黑