

量度 (mm): 体长 (♂) 5.03, (♀) 5.7; 体宽 (♂) 2.0, (♀) 3.0。头长 0.7; 头宽 (♂) 1.20, (♀) 1.33; 头顶宽 (♂) 0.58, (♀) 0.68。触角各节长 (♂) 0.63:1.40:0.63:0.80, (♀) 0.63:1.43:0.75:0.89。前胸背板长 1.05; 后缘宽 (♂) 1.75, (♀) 2.0。革片长 3.10, 楔片长 0.93。

观察标本: 1 ♂, 内蒙古海拉尔, 1981.VII.3, 邹环光采; 1 ♀, 同前, 1981.VII.5, 邹环光采。

中国其他记录: 内蒙古 [Vinokurov (1977); 呼盟、锡盟 (齐宝瑛、能乃扎布、李淑莉、李卫东、刘殊芳, 1994)]、新疆 [巩耐斯河 (Vinokurov, 1977)]。

分布: 内蒙古、新疆; 欧洲, 中亚, 蒙古, 俄罗斯 (远东), 北美。

(104) 沼泽原盲蝽 *Capsus palustris* Kulik, 1977

Capsus bilineatus Kulik, 1965c: 152 (preoccupied)

Capsus palustris Kulik, 1977: 27; Vinokurov, 1977: 114; Schuh, 1995: 714; Kerzhner & Josifov, 1999: 80.

作者未见此种标本。现据文献 (Kulik 1965; Vinokurov, 1977) 简记特征如下:

体锈黄色至锈褐色, 由前胸背板往后在体中线两侧各有一宽直黑带, 向后伸达膜片。头黄, 唇基黑色。触角黑色, 第 I 节黄色; 第 II 节相对较细, 棒状不明显。足淡色, 股节基部具深色斑, 亚端部有两个褐环; 胫节基部黑色; 后足胫节黑色。腹下褐色或黑色。

雄虫阳茎端针突亚端部膨大较明显。生活于湿草原的莎草科植物上 (Kulik, 1965)。

中国记录: 内蒙古 [Vinokurov (1977); 呼盟 (齐宝瑛、能乃扎布、李淑莉、李卫东、刘殊芳, 1994)]。

分布: 内蒙古; 蒙古, 俄罗斯 (远东)。

(105) 毛原盲蝽 *Capsus pilifer* (Remane, 1950)

Rhopalotomus pilifer Remane, 1950: 69.

Capsus pilifer (Remane): Carvalho, 1959: 66; Vinokurov, 1977: 110; Schuh, 1995: 774; Kerzhner & Josifov, 1999: 80

头黑, 头顶后缘具锈褐色或暗褐色完整连续的横带; 复眼几不呈柄状 (头顶侧区沿眼内缘下凹程度很弱)。触角第 I 节明显伸过唇基末端, 相对较 *C. cinctus* 为长; 第 II 节棒状明显, 后半较粗; 第 III 节基半黄白。喙几伸达后足基节。

前胸背板全黑; 侧缘略微凹弯。小盾片与半鞘翅全黑, 膜片烟黑褐。

足黑, 股节端部淡色。

量度 (mm): 体长 6.0, 体宽 3.0~3.55。头长 0.68, 头宽 1.33, 头顶宽 0.70。触角各节长 0.78:2.05:0.85:1.13。前胸背板长 1.06, 后缘宽 2.0。革片长 3.0, 楔片长 1.04。

观察标本: 1♀, 吉林长白山白山站, 1100m, 1986. VII. 3, 李新正采; 1♂, 吉林长白山二道白河, 2400m, 1986. VII. 5, 于超采; 1♂, 吉林高岭子, 1938. VIII. 6~10, M. Volkoff 采; 1♂, 黑龙江伊春五营, VI. 19; 1♀, 同前, 1980. VII. 19, 汪兴鉴采; 1♂, 黑龙江漠河, 1984. VII. 6, 陈萍萍采。

中国其他记录: 内蒙古 [Vinokurov (1977); 兴安盟 (齐宝瑛、能乃扎布、李淑莉、李卫东、刘殊芳, 1994)], 宁夏 [六盘山 (齐宝瑛、能乃扎布、李淑莉、李卫东、刘殊芳, 1994)]。

分布: 内蒙古、吉林、黑龙江、宁夏; 欧洲, 日本, 朝鲜, 俄罗斯 (远东地区、西伯利亚)。

(106) 瓦氏原盲蝽 *Capsus wagneri* (Remane, 1950) (图版III-10)

Capsus intermedius Reuter, 1884b: 25 (preoccupied)

Rhopalotomus wagneri Remane, 1950: 66.

Capsus wagneri (Remane, 1950): Carvalho, 1959: 70; Vinokurov, 1977: 106; Schuh, 1995: 737; Kerzhner & Josifov, 1999: 80.

头黑, 头顶后缘区有时具一对隐约的暗褐色横斑或不连续的横带。触角第Ⅰ节明显伸过唇基末端; 第Ⅱ节相对较细, 中段有时色较淡, 为锈褐色; 第Ⅲ、Ⅳ节较长。喙黄褐, 伸达后足基节末端。

前胸背板全黑, 或领及胝区锈褐或黄褐色。

足黄褐至锈褐色; 后足股节在部分个体中有两个红褐环, 环常较狭而色较淡; 后足胫节末端黑褐, 胫节刺黑色; 跗节第Ⅰ、Ⅱ跗分节淡黄褐, 第Ⅲ跗分节黑褐色。

腹下、前胸“侧板”、中、后胸侧板外半黑。

量度 (mm): 体长 5.8~6.6, 体宽 2.83~3.38。头长 0.75, 头宽 1.43, 头顶宽 0.73。触角各节长 0.78:2.0:0.83:1.03。前胸背板长 1.25, 后缘宽 2.25。革片长 3.0, 楔片长 1.0。

观察标本: 1♂, 吉林长白山二道白河, 740m, 1986. VII. 5, 于超采; 1♂, 吉林高岭子, 1940. VII. 5; 2♂♂3♀♀, 黑龙江伊春五营, 1980. VII. 18, 郑乐怡采; 3♂♂2♀♀, 同前, 1980. VII. 24, 郑乐怡采; 1♀, 同前, 1980. VII. 21, 汪兴鉴采; 3♂♂1♀, 黑龙江漠河, 1984. VII. 7, 陈萍萍采。

中国其他记录: 内蒙古 [Vinokurov (1977); 呼盟、兴安盟 (齐宝瑛、能乃扎布、李淑莉、李卫东、刘殊芳, 1994)]。