

量度 (mm): 体长 6.0, 体宽 3.0~3.55。头长 0.68, 头宽 1.33, 头顶宽 0.70。触角各节长 0.78:2.05:0.85:1.13。前胸背板长 1.06, 后缘宽 2.0。革片长 3.0, 楔片长 1.04。

观察标本: 1♀, 吉林长白山白山站, 1100m, 1986.VII.3, 李新正采; 1♂, 吉林长白山二道白河, 2400m, 1986.VII.5, 于超采; 1♂, 吉林高岭子, 1938.VIII.6~10, M. Volkoff 采; 1♂, 黑龙江伊春五营, VI.19; 1♀, 同前, 1980.VII.19, 汪兴鉴采; 1♂, 黑龙江漠河, 1984.VII.6, 陈萍萍采。

中国其他记录: 内蒙古 [Vinokurov (1977); 兴安盟 (齐宝瑛、能乃扎布、李淑莉、李卫东、刘殊芳, 1994)], 宁夏 [六盘山 (齐宝瑛、能乃扎布、李淑莉、李卫东、刘殊芳, 1994)]。

分布: 内蒙古、吉林、黑龙江、宁夏; 欧洲, 日本, 朝鲜, 俄罗斯 (远东地区、西伯利亚)。

(106) 瓦氏原盲蝽 *Capsus wagneri* (Remane, 1950) (图版 III-10)

Capsus intermedius Reuter, 1884b: 25 (preoccupied)

Rhopalotomus wagneri Remane, 1950: 66.

Capsus wagneri (Remane, 1950): Carvalho, 1959: 70; Vinokurov, 1977: 106; Schuh, 1995: 737; Kerzhner & Josifov, 1999: 80.

头黑, 头顶后缘区有时具一对隐约的暗褐色横斑或不连续的横带。触角第 I 节明显伸过唇基末端; 第 II 节相对较细, 中段有时色较淡, 为锈褐色; 第 III、IV 节较长。喙黄褐, 伸达后足基节末端。

前胸背板全黑, 或领及胫区锈褐或黄褐色。

足黄褐至锈褐色; 后足股节在部分个体中有两个红褐环, 环常较狭而色较淡; 后足胫节末端黑褐, 胫节刺黑色; 跗节第 I、II 跗分节淡黄褐, 第 III 跗分节黑褐色。

腹下、前胸“侧板”、中、后胸侧板外半黑。

量度 (mm): 体长 5.8~6.6, 体宽 2.83~3.38。头长 0.75, 头宽 1.43, 头顶宽 0.73。触角各节长 0.78:2.0:0.83:1.03。前胸背板长 1.25, 后缘宽 2.25。革片长 3.0, 楔片长 1.0。

观察标本: 1♂, 吉林长白山二道白河, 740m, 1986.VII.5, 于超采; 1♂, 吉林高岭子, 1940.VII.5; 2♂♂3♀♀, 黑龙江伊春五营, 1980.VII.18, 郑乐怡采; 3♂♂2♀♀, 同前, 1980.VII.24, 郑乐怡采; 1♀, 同前, 1980.VII.21, 汪兴鉴采; 3♂♂1♀, 黑龙江漠河, 1984.VII.7, 陈萍萍采。

中国其他记录: 内蒙古 [Vinokurov (1977); 呼盟、兴安盟 (齐宝瑛、能乃扎布、李淑莉、李卫东、刘殊芳, 1994)]。