

5. 触角第Ⅱ节全长深色。爪片与革片一色黑褐 6
 触角第Ⅱ节基部宽阔地淡色。爪片与革片淡褐或红褐 7
6. 头黄，有时部分加深；额具明显的红色横纹 栲木盲蝽（雄）*C. hasegawai*
 头黑褐，头顶两侧具一对黄斑。额上的横纹弱 狭长木盲蝽 *C. gotohi*
7. 除黄色的后缘外，前胸背板后部色加深 波氏木盲蝽 *C. potanini*
 前胸背板后部淡褐色或淡红褐色 8
8. 触角第Ⅲ节长与前胸背板的长度相等，或较长于后者 淡褐木盲蝽 *C. takaii*
 触角第Ⅲ节短于前胸背板长 栲木盲蝽 *C. hasegawai*

(107) 毛翅木盲蝽 *Castanopsides dasypterus* (Reuter, 1906) (图 67, 图版Ⅲ-11)

Lygus dasyspterus Reuter, 1906a: 28, 37; Hsiao, 1942: 263; Carvalho, 1959: 118.

Lygocoris (*Arbolygus*) *dasypterus* (Reuter): Kerzhner, 1979: 25, 27; Schuh, 1995: 796.

Arbolygus dasypterus (Reuter): Lu & Zheng, 1998c: 89.

Castanopsides dasypterus (Reuter): Yasunaga, 1998b: 108; Kerzhner & Josifov, 1999: 81.

体长椭圆形；体色变异较大，褐色至黑色；略具光泽；毛银白色。

头垂直，具光泽，黄褐色，具稀疏毛。雄头顶宽为头宽的 0.37 倍，雌为 0.40 倍；头顶中纵沟明显，后缘嵴完整而明显，较窄，头顶中央有一红或红褐色的十字形的斑；唇基基半褐色，向端部渐至黑色，有时上顎片、下顎叶及小颊深褐色，或唇基基部前方的头部全为黑色，额区两侧各有 4~5 条红或红褐色平行短横纹。触角第Ⅰ节黄褐色，内侧深褐色；雄虫第Ⅱ~Ⅳ节除第Ⅱ节的基部黄褐色外，其余均为黑褐色；雌第Ⅱ节基部 2/3 黄褐，其余部分黑褐色。喙伸达中足基节末端。

前胸背板黄褐，略带暗红色；胝黑色，有时二胝愈合为一大形黑斑；亚后缘加深为深褐色横带；或整个前胸背板为均一的黑色；后缘均极窄地黄白色；刻点均匀细小；毛较密，半直立，略短于前翅上的毛。领黄白色。

小盾片褐至黑色，端角浅黄色，从端角发出一模糊的黄褐色中纵线；具横皱。前翅革片和爪片黑褐至黑色，毛长密，银白色。楔片浅黄褐色，端部 1/3 深红褐色，内缘红色，长约为基部宽的 2 倍。膜片烟褐色，翅室内半、大室前方的一个大斑及膜片中央与脉平行的一个大斑为淡灰色。

体下黑褐，臭腺蒸发域及腹下各侧的宽带浅黄褐色。足黄褐；基节基部红褐至黑褐色；前、中足股节端部 2/3 红色，后足股节端部 2/3 黑褐；各足胫节基部及胫节刺黑褐色。

左阳基侧突感觉叶发达，端突相对细，端部向前弯曲。右阳基侧突狭长；端突直，基部宽，近端部缢缩。阳茎鞘仅近端部有一小片状突。阳茎端针突直。共具 4 个膜叶，除右侧的一个较小的膜叶无微刺外，其余膜叶端部表面均具微刺；导精管长筒形，次生生殖孔宽阔。