

旧大陆分布。世界已知约 20 种。我国已知 7 种。

种检索表

1. 后足胫节基部 $1/5 \sim 1/4$ 及末端黑，中央尚有一黑环。前胸背板前角处有一表面为丝绒状的圆形区域 淡领纹唇盲蝽 *Ch. pallidicollis*
 后足胫节不若上述，中央无黑环。前胸背板前角处无上述丝绒状圆斑，即使该处毛少，但表面决不成明显的丝绒状 2
2. 后足胫节基部 $3/4 \sim 4/5$ 黑色 3
 后足胫节基部 $1/3$ 黑及末端黑，其余淡色。触角第 II 节基部及端方 $2/5$ 黑色
 长角纹唇盲蝽 *Ch. longicornis*
3. 体大，长 $4.7 \sim 4.9$ mm，毛十分浓密蓬松。雄虫触角第 II 节全黑。丝状平伏毛二色（金黄色及银白色）。高海拔种类 玉龙纹唇盲蝽 *Ch. yulongensis*
 体较小，小于 4.5 mm。毛相对较稀短。雄虫触角第 II 节黄褐，两端黑色或端部黑色。丝状平伏毛一色（银白色） 4
4. 领黄褐色。喙只伸达中足基节 台湾纹唇盲蝽 *Ch. taivanus*
 领黑。喙伸达中足基节后端或过之 5
5. 阳茎端腹面偏左侧具骨化的刺状或杆状附器 6
 阳茎端腹面骨化附器缺 欧亚纹唇盲蝽 *Ch. gyllenhali*
6. 阳茎端腹面刺状附器粗钝而直，中央附器片状旋卷，不成杯状（图 69a~b）
 邻纹唇盲蝽 *Ch. spirifer*
 阳茎端腹面刺状附器尖而弯曲，中央附器大约成杯状（图 69c~e）
 狭领纹唇盲蝽 *Ch. angusticollis*

(115) 狭领纹唇盲蝽 *Charagochilus angusticollis* Linnavuori, 1961 (图 69c~e)

Charagochilus angusticollis Linnavuori, 1961: 162; Zheng, 1990: 210; Schuh, 1995: 738; Kerzhner & Josifov, 1999: 82.

近似 *longicornis*，色深，深色部分几全为黑色。

头顶在眼的内侧有一对小黄褐斑。触角第 I 节黄；第 II 节黄褐，淡色个体只最端部黑，深色个体两端黑，各占全长之 $1/5$ 左右，向端略微渐粗；第 III、IV 节黑，第 III 节最基部黄色。

前胸背板、小盾片及前翅似 *longicornis*。前胸背板光泽较强，丝状毛形成小毛斑；领有粉被。半鞘翅色暗；革片 Cu 脉外方沿脉有 $1 \sim 2$ 列刻点，外方一列常只限于前半；此刻点区与中裂之间区域前半质地呈绒状，无光泽，上生较密的黑褐色粗刚毛状，约成一密厚的毛层状；半鞘翅其余区域银白色的丝状卷曲毛组成的小毛斑紧贴翅表，位于直毛层之下，外观此区域略呈绒状；小毛斑整齐，数量较多。足股节基部黑，亚基部有一

白环,端半似 *longicornis*,后足胫节基部 3/4 黑,端部 1/4 黄白。

阳茎端骨化附器 3 枚,腹方骨化附器尖长,刺状,弯曲;中央附器杯状;背方骨化附器二叉状,长支粗壮,短支细;右侧微刺状或颗粒状骨化区域范围大(图 69c~e)。

量度(mm):体长 2.8~4.0,体宽 1.5~2.15。头长 0.3~0.37,头宽 0.8~0.9。头顶宽(♂) 0.35~0.4,(♀) 0.4~0.43。触角各节长 0.3~0.35:0.95~1.05:0.6~0.65:0.6~0.7。前胸背板长 0.90,后缘宽 1.25~1.8。革片长 1.45~2.0。

观察标本: 6 ♀♀,北京西山,1957.VIII.17~VIII.30; 1 ♀,河北雾灵山,1973.VIII.22 (TMNH); 1 ♀,山西太原,1974.VIII.23,杨家林采; 9 ♂♂ ♀♀,浙江天目山仙人顶,1965.VIII.15,王良臣采; 2 ♀♀,浙江杭州虎跑,1947.VIII.29; 1 ♂1 ♀,安徽太平,1932.IX~X,刘淦芝采; 3 ♂♂ 4 ♀♀,江西庐山,1957.VIII.20~25,应松鹤采; 2 ♂♂ 2 ♀♀,福建崇安三港,1965.VI.23,王良臣采; 1 ♀,福建建阳黄坑,1965.VI.9,王良臣采; 1 ♀,福建武夷九曲,1982.VII.28,任树芝采; 3 ♂♂ 3 ♀♀,福建邵武大竹岚,1948.VI.25~VII.11; 1 ♂2 ♀♀,河南安阳,1954.VII (枣树); 5 ♂♂ 3 ♀♀,湖北武昌珞珈山,1957.VII.7~VIII.12,应松鹤采; 1 ♂3 ♀♀,湖北房县桥上,1977.VI.15~16,邹环光、郑乐怡采; 1 ♂4 ♀♀,广东连县瑶安,1962.X.21~28,郑乐怡、程汉华采; 1 ♀,广东乐昌,1947.VIII.26 (ZSU); 1 ♀,广东广州中山大学校园,1980.IV.19,任树芝采; 1 ♀,广东高要鼎湖山,1962.X.2,郑乐怡、程汉华采; 1 ♂,广西龙胜粗江,1964.VIII.25,王良臣采; 1 ♂,广西那坡德孚,1350m,2000.VI.19,姚建采; 1 ♀,四川丹巴,1985.VIII.12,2100m,李新正采; 1 ♂,四川灌县二王庙 750~800m,邹环光采; 1 ♂1 ♀,四川金川城关 2000~2300m,1963.VII.15,邹环光采; 1 ♂3 ♀♀,四川峨眉山报国寺 600m,1957.IV.14~VI.7,郑乐怡、程汉华采; 1 ♂2 ♀♀,四川峨眉山清音阁,1957.V.28~VI.10; 4 ♀♀,四川宝兴硃碛 2200~2700m,1963.VI.25~VII.1,郑乐怡采; 1 ♀,四川马尔康 2600~2800m,1963.VIII.10,熊江采; 1 ♂1 ♀,峨眉山龙门洞 1800m,1957.IV.3~VI.3; 2 ♂♂ 2 ♀♀,四川峨眉山九老洞,1947.VII.8,郑乐怡、程汉华采; 1 ♂,四川峨眉山初殿,1957.VII.4; 4 ♂♂ 1 ♀,四川青城山,1957.VIII.13~16,郑乐怡采; 3 ♂♂,贵州贵阳,1983.VII.6~20,邹环光采; 5 ♂♂,贵州赤水桫椤金沙乡,2000.V.27~29,薛怀君采; 4 ♂♂ 3 ♀♀,贵州习水三岔河,800~1000m,2000.IX.26,李传仁采; 1 ♂3 ♀♀,贵州习水蔺江至平河,2000.VI.1,薛怀君采; 1 ♀,云南勐海,1979.X.5,凌作培采; 1 ♀,陕西喂子坪,1922.VIII.6; 1 ♀,陕西北火地塘,1580m,1998.VII.27,姚建采; 1 ♀,陕西周至厚畛子,1350m,1999.VI.21,灯诱,章有为采; 1 ♀,甘肃文县碧口碧峰沟,900~1450m,1998.VI.25,灯诱,姚建采; 甘肃文县七信沟,1992.VIII.15; 1 ♀,甘肃文县店坝正沟,1993.VIII.2; 1 ♂,甘肃康县清河林场,1400m,1998.VII.14,陈军采; 1 ♂,同前,杨星科采; 1 ♀,同前,袁德成采; 1 ♂,甘肃康县清河,1380~