

末端具深色狭带；第Ⅳ节淡红褐色，基部淡褐色。喙伸达后足基节。

前胸背板中度前倾，背面较平，后半略饱满，淡黄褐，盘域有光泽，后半淡橙褐色，中央后缘处渐成褐色；盘域表面不甚平整，略呈极浅稀的同色细刻点；后缘中段平直，侧角较狭，但不甚尖锐；侧面观侧缘略锐，呈黑褐色狭带状，但不成胝状缘；胝区宽大，二胝相连，表面较平，但界限清楚，微高于其后的盘域表面，较盘域光滑；背板前侧角各有1~2根长直立毛。前胸侧板近中部另有一淡黑褐色纵纹与上述黑色侧缘平行，短。

小盾毛均匀饱满，具极浅的密横皱，无刻点，黄褐色，中部有一黑褐纵带贯全长，两端渐尖。半鞘翅淡黄褐色，半透明，表面略粗糙，不甚平整，大致成极粗浅的不太规则的鲨鱼皮状，爪片接合缘狭窄地黑褐色，最外缘极狭窄地黑褐色。革片中段在中裂上以及端缘中部（革片中部纵脉末端）各有一小黑褐色斑，楔片外缘淡橙褐色。膜片淡灰色，几透明，脉同色。

作者所观察的标本足缺失。

量度 (mm)：体长9.25，体宽3.38。头长0.60，头宽1.39，头顶宽0.58。触角各节长1.50:3.80:3.65:1.43。前胸背板长1.05，后缘宽2.5。革片长4.15，楔片长1.43。

模式标本：正模♂，台湾台中和平（存NSMT）（未检查）。

观察标本：1♂，台湾南投惠孙林场，1990. II. 20，C. S. Tseng采，灯诱。

分布：台湾。

(123) 红褐耳盲蝽 *Cheilocapsidea rufescens* (Yasunaga, 1995)

Carvalhopantilius rufescens Yasunaga, 1995b: 455.

Cheilocapsidea rufescens (Yasunaga): Yasunaga & Kerzhner, 1998: 88; Kerzhner & Josifov, 1999: 83.

作者未见此种标本，现据文献整理描述如下：

体淡红褐色，带红色色泽；背面刚毛状毛不明显。头红褐，略具光泽，略呈鲨鱼皮状，具短稀直立毛。头顶为头宽的0.38~0.39倍，中纵沟弱。触角红褐色，几一色；第Ⅱ节端部以及第Ⅲ节的中部和端部色略深；第Ⅳ节的最基部黄色；第Ⅱ节长不达第Ⅰ节的3倍，略长于第Ⅲ节；第Ⅳ节长约为第Ⅲ节之半，略长于第Ⅰ节。喙伸达中足基节。

前胸背板红褐色，中部及两侧色略深；侧缘略呈棱状；盘域刻点细浅稀疏，刚毛状毛极短稀。小盾片前缘与中胸盾片中纵线处色略深。半鞘翅红褐色，具淡色半直立短刚毛；革片侧缘中段狭窄地色深，缘片末端色深；楔片深红色或血红色；膜片淡褐，脉部分红色。足淡红褐，股节基部色较淡。

腹下红褐，背面色深。

体长 8.15~8.40, 体宽 2.93。

模式标本: 正模♀, 台湾台中和平, Wulin (存 NSMT) (未检查)。

分布: 台湾。

26. 乌毛盲蝽属 *Cheilocapsus* Kirkaldy, 1902

Cheilocapsus Kirkaldy, 1902b: 259. **Type species:** *Cheilocapsus flavomarginatus* Kirkaldy, 1902; by monotypy.

Parapantilius Reuter, 1903: 5. **Type species:** *Parapantilius thibetanus* Reuter, 1903; by monotypy. Syonymized by Yasunaga & Kerzhner, 1998: 88.

体长椭圆形, 较大, 两侧近平行, 几无光泽。体具黑褐色较粗短的刚毛状毛以及银白色丝状平伏毛。

头垂直, 背面观后平伸, 额-头顶区均匀饱满, 唇基垂直, 基部向下弧弯, 稍侧扁, 位置低于额-头顶, 额与唇基间有一明显凹痕, 头顶中纵沟明显, 头顶后缘光滑无嵴。头背面观可见触角窝, 侧面观触角窝直径约为眼宽之半。触角长, 稍粗, 第Ⅰ节粗长, 向端不加粗, 直径约与眼宽相等, 伸过头端的部分在 2/3 以上, 具甚密的深色刚毛状毛; 第Ⅱ节亚香肠形, 端区几与第Ⅰ节等粗; 第Ⅲ、Ⅳ两节粗约为第Ⅱ节之半。小颊后端约伸达眼前端; 外咽片 (gula) 明显, 长。喙伸达中足基节前端或中部。

前胸背板中度前倾, 背面较平; 侧缘亚棱边状, 但最侧缘不锐, 侧缘黑纹状或具黑斑; 后缘中段平; 后侧角亚尖角状, 不伸出, 不上翘; 盘域遍布深密横皱, 侧方伸达侧缘; 领粗, 位置不下沉, 粗约为触角第Ⅰ节直径之半, 无光泽, 与盘域同色, 具两种毛, 数较多, 直立毛不排成行; 二胝不相连, 界限清楚, 肋前及肋间区连成一片, 似胝状, 与胝等高, 伸达领后缘, 肋及肋前区具毛, 同盘域, 但光滑无横皱。小盾片整体略抬升, 表面较平, 略饱满, 具密横皱, 毛被同前胸背板。半鞘翅毛基成很细浅的刻点状, 致使表面呈鲨鱼皮状, 刚毛状毛密, 平伏, 银白色丝状平伏毛长于前胸背板的丝状毛; 缘片遍布黑色刚毛状毛。

后足胫刺棕褐色。

雄虫阳茎端具多个膜叶、一枚针突及数枚其他的骨化附器。

亚洲东部分布。世界已知 5 种, 我国均有分布。

种检索表

1. 触角第Ⅲ节基部 2/3~3/4 与第Ⅳ节基部 1/5 淡色。楔片 1/3 以上色深 2
- 触角第Ⅲ节基部 1/3~1/2 淡色, 第Ⅳ节常全部淡色或最基部狭窄地淡色。楔片端部 1/7~1/5 色深 3
2. 体背面黑褐色, 阳茎端针突端部针状 暗乌毛盲蝽 *Ch. nigrescens*