



图 71 斑足乌毛盲蝽 *Cheilocapsus maculipes* Liu et Wang

a. 右阳基侧突 (right paramere); b. 左阳基侧突 (left paramere); c. 阳茎端 (vesica)。

(125) 黄缘乌毛盲蝽 *Cheilocapsus miyamotoi* Yasunaga, 1998

Parapantilius flavomarginatus Miyamoto et Yasunaga, 1989b: 259; (junior secondary homonym of *Cheilocapsus flavomarginatus* Kirkaldy, 1902); Schuh, 1995: 861.

Cheilocapsus miyamotoi Yasunaga in Yasunaga & Kerzhner, 1998: 88; Kerzhner & Josifov, 1999: 84.

作者未见此种标本, 现据文献整理特征如下:

体较大, 长椭圆形, 近两侧平行。

头黄褐色, 眼后具深褐色带; 毛稀; 触角窝顶缘黑褐色。触角深褐色, 第 I 节较粗, 粗约与眼宽相等, 最基部黑色; 第 II 节较明显地向端渐略加粗, 基半较淡, 基部 1/3 黄褐色; 第 III 节基部 1/2 淡黄白, 其余黑褐; 第 IV 节黑。喙刚伸达中足基节。

前胸背板黄褐, 胫间区后有一黑斑; 侧缘黑褐色。中胸侧板有一黑褐色斑。小盾片黄褐色, 末端前各侧有一黑斑。半鞘翅深褐色, 缘片、革片侧缘与楔片大部分黄色; 楔片末端深褐色; 膜片褐色, 脉深褐色。足黄褐色, 股节具深褐色斑, 各胫节末端深褐色。

腹下黄褐色。

雄虫阳茎端次生生殖孔右侧骨化附器粗短弯曲, 羊角状, 基部粗大, 端尖; 另一骨化附器长片状, 末端骤弯, 位于次生生殖孔左侧; 3 枚膜叶末端具骨化微刺区。

体长 10.5~10.9, 体宽 3.33~3.88。

分布: 台湾 {埔里、Funkiko [= Fenchihu] (Yasunaga, 1989, 1994)}, 日本。

(126) 暗乌毛盲蝽 *Cheilocapsus nigrescens* Liu et Wang, 2001 (图 72)

Cheilocapsus nigrescens Liu et Wang, 2001: 63.

体相对较大而色深，长椭圆形，两侧平行。

头背面观锈褐色，侧面观唇基端半以及上颚片下半以下均为淡黄或淡黄绿色。触角第 I、II 节均为深褐色至紫黑褐色，一色或几一色，毛相对粗密；第 I 节长为头宽的 1.67 倍；第 II 节细，长为第 I 节的 2.2 倍；第 III 节基部 $\frac{3}{4}$ 黄白或淡黄绿色，端部 $\frac{1}{4}$ 黑色；第 IV 节基部 $\frac{1}{5}$ 黄色，其余黑色。喙伸达中足基节。

前胸背板黄褐色，略前倾；侧缘黑，与眼后以及领侧方的黑带相连续；胛间有一中央黑斑；后缘宽为背板长的 1.8 倍；后侧角黑。领粗，与触角第 II 节等粗，表面略具浅横皱，领和其后的胛间区中纵线为一连续的红褐或黑褐色细纹。中胸侧板有一小黑斑。小盾片污褐色至污黑褐色，末端淡黄色。半鞘翅具横皱；爪片与革片为均一的深褐色至黑色，革片银白色丝状毛呈毛斑状；缘片黄色；楔片黄色，端角与基内侧色加深。膜片烟色，脉黑褐。足长，股节橙红色，具小黑斑点；胫节淡黄褐或淡灰绿，后足胫节基部 $\frac{1}{3}$ ~ $\frac{2}{5}$ 黑褐。腹下淡黄色。

雄虫生殖囊常为红色；左阳基侧突大，中部近直角弯曲，基半相对粗；左阳基侧突相对长，端突端部尖；阳茎端次生生殖孔右侧前方骨化附器直而渐尖，较简单，左侧前方骨化附器较粗短，亦较简单；后方右侧骨化附器（= 针突 spicule）基部甚宽，近圆形，然后一侧前伸成细长的针状；后方左侧骨化附器为一简单片状，端尖。

量度 (mm)：体长 12.5~13.0，体宽 3.5~4.0。头长 1.2，头宽 1.5，头顶宽 0.63。触角各节长 2.5:5.5:2.2:1.0。前胸背板长 1.8~1.9，后缘长 3.3~3.5。革片



图 72 暗乌毛盲蝽 *Cheilocapsus nigrescens* Liu et Wang

a. 右阳基侧突 (right paramere); b. 左阳基侧突 (left paramere); c~f. 阳茎端 (vesica)。