

甘肃文县范坝, 1997. IX. 5; 1♀, 甘肃康县清河林场, 1400m, 1998. VII. 14, 张学忠采; 1♀, 甘肃康县白云山, 1250~1751m, 1998. VII. 12, 王书永采; 1♂, 甘肃康县白云山, 1250~1750m, 1998. VII. 12, 姚建采; 1♀, 甘肃宕昌, 1800m, 1998. VII. 7, 姚建采; 1♂ 1♀, 云南丽江, 1979. VII. 12, 凌作培采; 1♀, 同前, 邹环光采; 1♂ 3♀♀, 同前, 刘国卿采; 3♀♀, 云南武定狮子山, 1979. VII. 10。

分布: 福建、湖北、湖南、广西、四川、云南、宁夏、甘肃、西藏。

27. 光盲蝽属 *Chilocrates* Horváth, 1889

Chilocrates Horváth, 1889: 39. **Type species:** *Chilocrates lenzii* Horváth, 1889 (junior synonym of *Capsus patulus* Walker, 1873); by monotypy.

Shana Kirkaldy, 1902c: 315. **Type species:** *Shana ravana* Kirkaldy, 1903; by monotypy.

Liocoridea Reuter, 1903: 13. **Type species:** *Liocoridea mutabilis* Reuter 1903; by monotypy.

Gismunda Distant, 1904d: 463. **Type species:** *Gismunda chelonia* Distant, 1904; by original designation.

体中小型, 较厚实宽圆, 黄褐、红褐、或黑褐色, 有强光泽。

头垂直, 毛短或几无毛, 无刻点; 前面观头的眼前部分较发达, 与头的其余部分等长或更长; 侧面观上颚片相对较宽; 额-头顶饱满, 中纵沟极浅, 几不可辨, 头顶甚宽, 后缘具完整的嵴, 或嵴只隐约可见, 至完全无嵴。眼常斜置。触角第Ⅱ节多成明显的棒状, 在长度的一半以后明显加粗, 略短于前胸背板后缘宽。

前胸背板拱隆, 较前倾; 光泽强, 几无毛或毛很短小; 领明显; 脐略隆出, 常成横列的椭圆形, 界限清楚, 光滑, 二脐不相连或前半相连, 脐间区常略凹或几不下凹, 光滑无刻点; 盘域刻点明显或较明显, 较均匀或不甚均匀; 后缘在小盾片前的部分较平直。小盾片略隆出, 可具稀横皱, 刻点几无或极稀浅; 中胸盾片不外露。半鞘翅具黄褐色刚毛状毛, 较短而半平伏; 前缘较明显拱弯, 刻点明显密于前胸背板。前缘裂缺口深大。后足胫节常较粗短, 胫刺黑色, 刺基多有一小黑点斑。

雄载肛突左壁明显隆出成黑色纵走的宽圆嵴。左阳基侧突杆部弯曲成直角, 感觉叶发达突出, 杆的亚端部略膨大, 端突钩状。右阳基侧突长度中等, 感觉叶发达, 端突较细长, 略弯, 向端渐细, 在体时端突多弯向尾方(此点可与外表相似的 *Liistonotus* 属区别)。阳茎端有针突一枚, 膜叶分为两叶, 膜叶表面有具细齿的骨化区, 次生生殖孔小, 孔缘向端方延伸出一短骨化带。

亚洲大陆东南部分布。现知共3种, 包括1新种; 我国均有分布。

种检索表

1. 半鞘翅一色。体相对较小, 前翅前缘拱弯程度较小 多变光盲蝽 *Ch. patulus*