

齿。右阳基侧突在端突基部具椭圆形的不骨化区。雌虫环骨片椭圆形，相互距离大于骨片直径 (Rosenzweig, 1997)。

古北界分布，多数种类见于地中海东岸地区。世界已知 29 种，我国记录 1 种。

(132) 云斑俊盲蝽 *Closterotomus marmoratus* (Lindberg, 1934)

Calocoris marmoratus Lindberg, 1934b: 36; Carvalho, 1959: 41; Schuh, 1995: 712.

Closterotomus marmoratus (Lindberg): Rosenzweig, 1997: 150; Kerzhner & Josifov, 1999: 87.

体长椭圆形，两侧微成弧形，光泽甚弱。毛二型，见属征。

头斜平伸，背面观为端部圆钝的三角形；额-头顶区均匀饱满，为不甚均匀的淡红褐色；额部中纵带淡黄，隐约可见颜色略深的平行横纹；头顶两侧略凹下，色略淡，呈不均匀的淡黄色；两种毛混生，较短密，黑色刚毛状毛较直立，额的黄色中纵带几无黑色毛；头顶中纵沟虽几不下凹，但由密生的丝状毛可见“X”形痕迹；额（雄）约与眼等宽 (Lindberg, 1934)，或（雌）略宽于眼。唇基与额间下陷，唇基侧面观不突然隆出，背面中线区黑毛较明显。触角第Ⅰ节细长，粗约为眼宽之半，粗细一致，淡红褐色，斑驳，均匀密被黑色较长的半平伏刚毛，毛长约为该节直径之半；第Ⅱ节线形，粗约为第Ⅰ节之半，大部淡黄白，端部 1/5 污黑褐，具较平伏的短毛和较直立的长毛，毛的排列和长度不甚均一；第Ⅲ节污灰黄色，向端渐成污黑褐，第Ⅳ节污黑褐，两节均为细线形，粗约为第Ⅱ节之半。喙伸达中足基节中部 (Lindberg 1934 原描述为伸达后足基节)。

前胸背板中度前倾，背面则较平；侧缘及后缘中段直；领、胝区及后缘宽带淡黄-淡黄褐色，盘域大部因红褐、栗褐和淡黄色不整齐的斑点混生而成斑驳状。领微粗于触角第Ⅱ节，具较密的两类毛，黑色刚毛状毛直立。胝轻微隆出，后缘界限明显，前方界限不显，似不伸达领的后缘，侧方不达背板前侧角，二胝不相连，胝区与胝间区均具毛；盘域具极浅的横皱，两种毛均较短密，银白色平伏毛方向杂乱，黑色刚毛状毛半直立，指向后方。小盾片几为等边三角形，淡黄色，中部呈斑驳的淡红褐色；具浅横皱，毛同革片。中胸盾片几不外露。半鞘翅大部色斑同前胸背板盘域，但栗褐色斑少，爪片内半及革片中段由内角斜向前外方的宽带渐成淡褐，缘片整个为淡黄白色。爪片及革片具浅密刻点，略呈鲨鱼皮状；两类毛较密，黑色毛几乎平伏；楔片淡黄白，最末端狭窄地黑色；膜片烟黑褐，楔片端角后有一深色斑，其后为一不大的淡斑。脉红。

足淡黄；各足股节端半被黑色刚毛状毛，毛基具红黑色小点斑；后足股节端半淡红褐，后足股节黑毛较密，淡色的股节基半毛细白而密；各足胫节淡色，端部略加深，胫节刺黑，后足胫节刺长约等于该节直径。跗节两端淡黑褐，中段淡色。

体下一色淡黄褐。

量度 (mm): (♀) 体长 8.13, 体宽 3.25。头长 0.50, 头宽 1.13, 头顶宽 0.47。

触角各节长 1.0:3.0:1.83:0.68。前胸背板长 1.09，后缘宽 2.35。革片长 3.85，楔片长 3.25。〔(♂) 体长 8.0，体宽 2.8 (Lindberg, 1934)〕。

模式标本：正模♂，甘肃南部 (“Tung-tung-siao”) (存 NHRS) (已检查)。

观察标本：1♀，宁夏西吉，1988.VII.17，高兆宁采 (采自一种植物“烂皮袄”)。

分布：甘肃、宁夏。

29. 淡盲蝽属 *Creontiades* Distant, 1883

Creontiades Distant, 1883: 237. **Type species:** *Megacoelum rubrinerve* Stål, 1862; by monotypy.

Pantiliodes Noualhier, 1893: 15. **Type species:** *Phytocoris punctatum* Reuter, 1877 (= *Phytocoris pallidus* Rambur, 1839); by monotypy. Synonymized by Reuter, 1905c: 3.

Kangra Kirkaldy, 1902b: 257. **Type species:** *Kangra dudgenoni* Kirkaldy, 1902 (= *Capsus pallidifer* Walker, 1902); by monotypy. Synonymized by Distant, 1904a: 105.

Tricholygus Poppius, 1910: 47. **Type species:** *Tricholygus hirsutus* Poppius, 1910; by original designation. Synonymized by Carvalho, 1952a: 87.

体淡色，淡黄褐或污黄褐，长椭圆形，两侧较平行。无光泽或光泽较弱。毛多略弯曲，近平伏而常有闪光。

头几乎伸或较前倾，背面观眼前部分较宽钝，侧面观唇基前缘圆缓地略下倾，额-头顶区均匀饱满，额常具若干平行横凹纹，头顶中纵沟细深，头顶后缘光滑无嵴。触角长，相对略粗，但各节为线形或亚线形，似 *Megacoelum* 属，第Ⅰ节最粗，除亚端部内侧的数根深色粗刚毛外，全长常被稀疏直立毛；第Ⅱ~Ⅳ节毛短小，密而半平伏，有闪光。

前胸背板较平置，相对较短；领明显，位置似较 *Megacoelum-Orientomiris* 为高，似相对更粗，无光泽，领具两种毛，一为较平伏的闪光丝状毛，数较多，另一种为排成一列的稀疏深色直立长毛；胝及胝间区均略隆出，略高于周围的盘域表面，光滑或具毛；盘域平，后缘平直，表面多不甚平整光滑，后半常多少具疏浅刻点。小盾片常具横皱。半鞘翅无刻点，具较平伏而常有闪光的毛，部分的毛基部成小黑点斑状。足细长，似 *Megacoelum-Orientomiris* 类。

阳茎端无骨化附器，具多个膜叶，膜叶在次生生殖孔两侧的配置大体对称。

此属长期以来与 *Megacoelum* 多有混淆，一些种类曾置于该属中。

我国已知 3 种。

种检索表

1. 触角第Ⅰ节明显长于头宽。爪片内缘红色 花肢淡盲蝽 *C. coloripes*