

模); 1♂1♀, 江西余江刘家, 1956. VIII. 15, 芝麻; 1♀, 四川金川城关, 2000~2300m, 1963. IX. 8, 熊江采; 1♂1♀, 云南保山潞江, 1960. III. 25, 棉田, 韩寅恒采 (*C. gossypii* Hsiao 的副模)。

分布: 江西、四川、台湾; 日本。

经研究 *C. gossyii* 的副模和日本产标本, 认为 *gossyii* Hsiao 是 *bipunctatus* Poppius 的次异名 (新异名)。

(134) 花肢淡盲蝽 *Creontiades coloripes* Hsiao, 1963 (图版IV-1)

Creontiades coloripes Hsiao, in Hsiao et Meng, 1963: 442, 448; Yasunaga, 1997a: 543; Kerzhner & Josifov, 1999: 90.

体黄褐色至污黄褐色。

头几乎平伸, 几无光泽; 一色黄褐色, 或唇基端半, 上颚片、额区的平行横纹、头顶沿眼内侧及中纵沟常染有红色色泽, “颈”部亦染红色。触角淡黄, 第Ⅰ节较长, 明显长于头宽, 常略深或染有红色, 散布红色小点斑, 直立毛淡色, 稀, 略短于该节直径; 第Ⅱ节端部1/4渐染红色; 第Ⅲ节基部2/3淡灰褐色, 端部1/3灰黄, 第Ⅲ节长, 只微短于Ⅱ。喙略伸过后基节末端。

前胸背板几乎平置; 亚后缘区较狭窄地黑褐色, 最后缘狭窄地淡色, 盘域后半部分毛基成小黑点斑状; 领的直立毛基部有小黑点斑; 肪无光泽, 表面呈极细的鲨鱼皮状, 具毛, 肪间区毛密; 盘域具光泽, 表面不甚平整, 微具稀刻点 (毛基部微下陷所致), 呈不明显的浅刻皱状, 毛半平伏至半直立, 较长而稀, 淡色。

小盾片平, 具横皱, 深褐或黑褐色, 中央基半具一对黑纵带, 向后渐狭, 止于长度之半, 二带间的中纵纹淡黄色, 向后渐成红褐色, 渐深, 至后端成一黑斑状, 中纵纹后半两侧淡色, 散布一些小黑点斑; 毛长, 半直立或直立, 基部中央的毛平伏而密。半鞘翅淡黄褐或污黄褐, 有时略呈半透明状; 爪片内缘与接合缘、革片在爪片端以后的内缘直至楔片内角狭窄地红色, 或楔片内角成红褐色斑状, 缘片端角处亦同; 爪片内侧的红色区域内常散布小黑点斑。膜片淡烟色, 脉红。

足同体色, 后足股节端半红褐, 具红褐色小碎斑; 肱节刺淡色。

量度 (mm): 体长6.75~7.05, 体宽2.25。头长0.58, 头宽1.15, 头顶宽0.35。触角各节长1.25:2.90:2.60:1.28。前胸背板长1.0, 后缘宽1.88。革片长3.63, 楔片长0.90。

模式标本: 正模♂, 河南安阳 (存IZAS) (未检查)。

观察标本: 1♂(副模), 河南安阳, 1954. IV. 25, 孟祥玲采; 1♀(副模), 河南安阳, 1955. V. 26, 韩寅恒采; 3♀♀, 河南安阳, 1954. IV. 25, 韩寅恒、孟祥玲采于苜蓿上; 2♂♂1♀, 河南安阳, 1955. VII. 5; 1♀, 山东济南, 1935. VI. 10; 1♀, 湖北当

阳, 1960. VIII. 4, 陈玉陆采; 1♀, 湖北利川城关, 1977. VII. 26, 郑乐怡采; 1♂, 江西贵溪, 1956. VIII. 10, 采自芝麻; 1♂1♀, 广州; 2♀♀, 四川雅安, 1957. VII, 采自水稻; 1♀, 四川德阳, 1958. VII, 采自玉米; 1♂1♀, 四川绵阳, 1957. VII. 芝麻; 3♂♂6♀♀, 贵州习水蔺江, 2000. IX. 24~28, 周长发采; 2♀♀, 贵州习水三岔河, 800~1000m, 2000. IX. 26, 李传仁采; 1♂, 贵州赤水金沙沟, 2000. IX. 23, 周长发采; 2♂♂3♀♀, 贵州赤水桫椤保护区, 200~600m, 2000. IX. 20~23, 李传仁采; 1♂, 云南屏边大围山, 1300m, 1956. VI. 23, 黄克仁采; 1♂, 陕西汉中, 1963; 1♂, 陕西佛坪, 950m, 1998. VII. 23, 姚建采; 1♂2♀♀, 台湾南投惠孙林场, 1990. II. 20; C. S. Tseng leg, 灯诱 (NMNH)。

分布: 山东、河南、湖北、江西、四川、贵州、云南、陕西、台湾; 日本, 朝鲜半岛。

(135) 小淡盲蝽 *Creontiades minutus* Poppius, 1915

Creontiades minutus Poppius, 1915a: 12; Carvalho, 1959: 75; Schuh, 1995: 745; Yasunaga, 1997a: 553; Kerzhner & Josifov, 1999: 90.

体小, 淡污黄色。

头前倾, 几一色, 无红色或深色成分, 只中纵线略色深; 额区的平行横纹不明显, 几不可辨。触角淡黄色, 几一色, 第Ⅲ、Ⅳ两节的端部略加深成淡灰褐色; 第Ⅰ节明显短于头宽, 散布很细小的红点, 毛淡色, 半直立, 较短, 约等于第Ⅰ直径之半。喙伸达或略过后足基节末端。

前胸背板有光泽, 轻度前倾, 背面较平; 颜色同盘域, 直立毛基有或无深色小点斑; 盘域有极浅细而稀的刻点, 成浅刻皱状, 几无小黑点斑; 亚前缘区成红褐或黑褐横带状, 或由若干小黑点斑组成; 后缘狭窄地黄色。胝光滑, 有光泽, 几无毛。

小盾片饱满, 中线处有时有一细白纹带贯全长, 中线两侧具少许细小深色小点斑, 向外渐少, 末端具一小红斑。半鞘翅淡黄色, 半透明; 爪片内半具小黑点斑; 革片几无小黑点斑, 在爪片末端后的内缘红色或褐色; 半鞘翅毛被细短, 密度中等, 毛闪光, 半平伏。膜片淡烟色, 脉淡色。

足淡色, 后足股节端半红色。体下淡色。

量度 (mm): 体长 5.50, 体宽 1.70。头长 0.65, 头宽 1.05, 头顶宽 0.35。触角各节长 0.70:1.55:1.98:0.88。前胸背板长 0.88, 后缘宽 1.63。革片长 2.53, 楔片长 0.68。

模式标本: 选模♂, 台湾安平 (存 HNHM) (未检查)。

观察标本: 1♀, 海南尖峰, 1980. IV. 15, 邹环光采, 灯诱。

中国其他记录: 台湾台东、屏东垦丁 (Yasunaga, 1997)。