

阳, 1960.VIII.4, 陈玉陆采; 1♀, 湖北利川城关, 1977.VII.26, 郑乐怡采; 1♂, 江西贵溪, 1956.VIII.10, 采自芝麻; 1♂1♀, 广州; 2♀♀, 四川雅安, 1957.VII, 采自水稻; 1♀, 四川德阳, 1958.VII, 采自玉米; 1♂1♀, 四川绵阳, 1957.VII. 芝麻; 3♂♂6♀♀, 贵州习水蔺江, 2000.IX.24~28, 周长发采; 2♀♀, 贵州习水三岔河, 800~1000m, 2000.IX.26, 李传仁采; 1♂, 贵州赤水金沙沟, 2000.IX.23, 周长发采; 2♂♂3♀♀, 贵州赤水桫欏保护区, 200~600m, 2000.IX.20~23, 李传仁采; 1♂, 云南屏边大围山, 1300m, 1956.VI.23, 黄克仁采; 1♂, 陕西汉中, 1963; 1♂, 陕西佛坪, 950m, 1998.VII.23, 姚建采; 1♂2♀♀, 台湾南投惠孙林场, 1990.II.20; C. S. Tseng leg, 灯诱 (NMNH)。

分布: 山东、河南、湖北、江西、四川、贵州、云南、陕西、台湾; 日本, 朝鲜半岛。

(135) 小淡盲蝽 *Creontiades minutus* Poppius, 1915

Creontiades minutus Poppius, 1915a: 12; Carvalho, 1959: 75; Schuh, 1995: 745; Yasunaga, 1997a: 553; Kerzhner & Josifov, 1999: 90.

体小, 淡污黄色。

头前倾, 几一色, 无红色或深色成分, 只中纵线略色深; 额区的平行横纹不明显, 几不可辨。触角淡黄色, 几一色, 第Ⅲ、Ⅳ两节的端部略加深成淡灰褐色; 第Ⅰ节明显短于头宽, 散布很细小的红点, 毛淡色, 半直立, 较短, 约等于第Ⅰ直径之半。喙伸达或略过后足基节末端。

前胸背板有光泽, 轻度前倾, 背面较平; 领色同盘域, 直立毛基有或无深色小点斑; 盘域有极浅细而稀的刻点, 成浅刻皱状, 几无小黑点斑; 亚前缘区成红褐或黑褐横带状, 或由若干小黑点斑组成; 后缘狭窄地黄色。胫光滑, 有光泽, 几无毛。

小盾片饱满, 中线处有时有一细白纹带贯全长, 中线两侧具少许细小深色小点斑, 向外渐少, 末端具一小红斑。半鞘翅淡黄色, 半透明; 爪片内半具小黑点斑; 革片几无小黑点斑, 在爪片末端后的内缘红色或褐色; 半鞘翅毛被细短, 密度中等, 毛闪光, 半平伏。膜片淡烟色, 脉淡色。

足淡色, 后足股节端半红色。体下淡色。

量度 (mm): 体长 5.50, 体宽 1.70。头长 0.65, 头宽 1.05, 头顶宽 0.35。触角各节长 0.70:1.55:1.98:0.88。前胸背板长 0.88, 后缘宽 1.63。革片长 2.53, 楔片长 0.68。

模式标本: 选模♂, 台湾安平 (存 HNHM) (未检查)。

观察标本: 1♀, 海南尖峰, 1980.IV.15, 邹环光采, 灯诱。

中国其他记录: 台湾台东、屏东垦丁 (Yasunaga, 1997)。

分布：海南、台湾；日本。

30. 拟草盲蝽属 *Cyphodemidea* Reuter, 1903

Cyphodemidea Reuter, 1903: 17. **Type species:** *Cyphodemidea variegata* Reuter, 1903 (= *Lygus saundersi* Reuter, 1896); by monotypy.

体椭圆形。与 *Lygus* 属相近，体形亦与之类似，相对较狭。

头垂直。额有光泽，无成对的横棱。头顶后缘嵴不完整，中部平坦。触角第Ⅱ节长于头宽，深色。喙伸达或略伸过后足基节末端。

前胸背板饱满，有光泽，后缘中部不向前凹弯，前侧角圆，盘域具浅稀刻点，胝具毛。小盾片饱满，较隆起，具黑斑。半鞘翅两侧近平行，革片后半具浅而密度中等的刻点，刻点间距离与刻点直径约等；毛二型：刚毛状毛长密，前、后毛叠覆；近爪片缝处具密集的白色丝状毛。膜片被微毛。后足胫节具黄褐色胫节刺，刺基小黑点斑有或无。

雄性外生殖器构造与 *Lygus* 属类似。左阳基侧突感觉叶表面具微齿，端突末端平截，具二尖。右阳基侧突端部显著狭小。阳茎鞘具一枚较为狭尖的片状突。阳茎端结构似 *Lygus* 属，具一枚较粗的针突，大膜叶似 *Lygus* 属，小膜叶甚为退化，次生生殖孔下方有一小丛微刺。

雌性交配囊后壁：与 *Lygus* 属基本相似，支间骨片短宽，腹缘弧形；支间叶宽短，向中渐狭尖，达于中突；侧叶成狭带状，位于支间叶前，较为骨化；背结构似 *Lygus* 属，成横列的菱形，向两侧渐狭尖；中突短柱形。

东亚分布。已知共 1 种。

(136) 萨氏拟草盲蝽 *Cyphodemidea saundersi* (Reuter, 1896) (图 74, 图版 IV-2)

Lygus saundersi Reuter, 1896b: 97; Carvalho, 1959: 128; Zheng & Yu, 1992: 353.

Cyphodemidea saundersi (Reuter): Schwartz & Foottit, 1998: 356; Kerzhner & Josifov, 1999: 92.

Cyphodemidea variegata Reuter, 1903: 19. Synonymized by Schwartz & Foottit, 1998: 356.

体长椭圆形，黄褐色，棕绿色，棕褐色或黑褐色，具较多的黑斑。

头底色黄褐，额-头顶区中线、两侧，以及后缘区域常有黑带，唇基、上颚片及头的侧下方亦常黑。触角黄色，第Ⅰ节腹面常色较深；第Ⅱ节粗线形，相对较短，污橙褐或污红褐色，两端常为黑褐色；第Ⅲ、Ⅳ节黑，相对较长。

前胸背板前叶与后侧角区域黑色，领全部或部分黄白，胝前与盘域后半黄褐，后侧角最端部有一小白斑。前胸侧板黑。小盾片淡黄，具“W”形黑斑，末端黄白。爪片与革片黑，有光泽，革片毛的情况见属征；楔片淡色，基部与端角黑色，最外缘淡色，两端黑。膜片烟色，具 3 个淡色晕斑。后足胫节淡黄褐，两端黑褐色。体下黑色，具斑驳