

烟盲蝽亚族 Subtribe Dicyphina

摩盲蝽亚族 Subtribe Monaloniina

蕨盲蝽族 Tribe Bryocorini

其中重要的变动一是扩大了叶盲蝽亚科的范围，将合垫盲蝽类、束盲蝽类以及跳盲蝽类均包括在内；另一是将烟盲蝽置于单室盲蝽亚科之中；此外，又将齿爪盲蝽类划为族级单元，归入盲蝽亚科的名下。

此系统中，新含意的叶盲蝽亚科虽有共有衍征的支持而为单系群，但所包括的各大类在外表和构造上差别较大，致使在实用上有某些不方便之处。

不久后，Schuh 和 Slater (1993) 在《*True bugs of the world*》一书中所用的盲蝽科系统则有所变更，共分为 8 亚科 26 族：

单室盲蝽亚科 Subfam. Bryocorinae

蕨盲蝽族 Tribe Bryocorini

烟盲蝽族 Tribe Dicyphini

烟盲蝽亚族 Subtribe Dicyphina

摩盲蝽亚族 Subtribe Monaloniina

泡盾盲蝽亚族 Subtribe Odoniellina

宽垫盲蝽族 Tribe Eccritotarsini

宽垫盲蝽亚族 Subtribe Eccritotarsina

帕劳盲蝽亚族 Subtribe Palaucorina

细爪盲蝽亚科 Subfam. Cylapinae

毛膜盲蝽族 Tribe Bothriomirini

细爪盲蝽族 Tribe Cylapini

尖头盲蝽族 Tribe Fulviini

齿爪盲蝽亚科 Subfam. Deraeocorinae

沟齿爪盲蝽族 Tribe Clivinemini

齿爪盲蝽族 Tribe Deraeocorini

透齿爪盲蝽族 Tribe Hyaliadini

柄眼齿爪盲蝽族 Tribe Saturniomirini

苏齿爪盲蝽族 Tribe Surinamellini

短角齿爪盲蝽族 Tribe Termatophylini

树盲蝽亚科 Subfam. Isometopinae

盲蝽亚科 Subfam. Mirinae

赫盲蝽族 Tribe Herdoniini

透翅盲蝽族 Tribe Hyalopeplini

- 竹盲蝽族 Tribe Mecistoscelini
- 盲蝽族 Tribe Mirini
- 红黑盲蝽族 Tribe Resthenini
- 狭盲蝽族 Tribe Stenodemini
- 合垫盲蝽亚科 Orthotylinae
  - 跳盲蝽族 Tribe Halticini
  - 聂盲蝽族 Tribe Nichomachini
  - 合垫盲蝽族 Tribe Orthotylini
- 叶盲蝽亚科 Phylinae
  - 敖盲蝽族 Tribe Auricillocorini
  - 蚁叶盲蝽族 Tribe Hallodapini
  - 奇盲蝽族 Tribe Leucophoropterini
  - 叶盲蝽族 Tribe Phylini
  - 束盲蝽族 Tribe Pilophorini
- 撒盲蝽亚科 Psallopinae

Schuh (1995) 在他的《*Plant bugs of the world*》书中同样采用了上述系统; Kerzhner & Josifov (1999) 在古北界目录中亦采用该系统。本书在盲蝽亚科方面所采用的系统亦同。

### (三) 盲蝽亚科的分类系统问题

盲蝽亚科 (Mirinae) 在 Reuter (1910) 系统中分为 Miraria、Mecistoscelaria、Dionconotaria、Restheniaria 和 Capsaria 共 5 个 divisions。其中 Miraria 与现代系统中的 Stenodemini 相当; Dionconotaria 只包括 *Dionconotus* 一属; Capsaria 相当于现代系统中的 Mirini。

Carvalho (1952) 系统中, 盲蝽亚科包括 Pithanini、Stenodemini、Mecistoscelini、Mirini、Resthenini、Hyalopeplini 与 Herdoniini, 共 7 族。与上一系统相比, Dionconotaria 被并入 Mirini; 并将透翅的 Hyalopeplini、蚁形的 Herdoniini 与 Pithanini 三类从 Mirini (= Capsaria) 中分出。

Schuh 和 Slater (1993) 或 Schuh (1995) 的系统中, 盲蝽亚科共包括 6 个族, 已如上表所示; 与 Carvalho (1952) 系统十分相近, 差别之处在于采纳了 Schwartz (1987) 的意见将 Pithanini 视为 Stenodemini 的异名, 因而前者包括的属归入 Stenodemini 中。

在此 6 族中, Herdoniini 分布于新热带与非洲地区, Resthenini 亦为美洲分布的类群。我国已知的盲蝽亚科种类分布属于 Hyalopeplini、Mecistoscelini, Mirini 与