

头半垂直。唇基黑。头顶后半锈褐，其余部分渐成深褐至黑褐，有时有一淡色宽纵带，眼后区黄白；淡色个体头部除唇基外几全部为污淡黄褐；淡色个体亦同；下颚片背方或背、腹方淡黄褐。头侧面观唇基膝状下折，与额间有一明显的浅痕相隔，以致侧面观头的背缘不成连续的圆滑状态。头部淡褐色刚毛状毛近平伏至近直立，密度中等，银白色平伏丝状毛密，组成小毛斑状，向前斜指向中线，额毛的排列隐约呈若干平行斜横纹状。头顶中纵沟不显，成一复有丝状毛的细纵带状，沟与眼间的肾形区域表面具明显而均匀的小网格状浅微刻；头顶后缘似略微圆隆，具3小丛银白丝状毛。触角第Ⅰ节粗，直径与眼宽之比为1:1.5，微弯，长度之半伸过唇基末端，锈褐至黑褐色，密被黑色粗刚毛状毛，半平伏，长近该节直径之半；第Ⅱ节明显呈棒状，向端加粗，后半尤显，端部最粗处约为第Ⅰ节的两倍，被细而极密的短毛，半平伏，雌虫基部 $2/5 \sim 1/2$ 锈褐，其余黑色，雄虫几全部为锈褐色，向端渐成黑色；第Ⅲ、Ⅳ节线形，黑褐或黑，各节基部 $1/5 \sim 1/4$ 黄白色。喙伸达中足基节末端。

前胸背板领粗，表面与其后的盘域平齐，黑褐色，前缘较淡，具直立刚毛状毛及多数银白色丝状毛。盘域底色黄褐至锈褐，具3条宽黑纵带由领向后伸达背板后缘，后缘处可连成深色横带状；深色个体中，盘域可全为黑色；淡色个体中，黑纵带甚细而淡，二侧带尤淡，中带成断续的长黑斑状，领的后缘两侧黑斑状，最后缘可狭细地黄白色。胫平坦或微隆，黑，在最淡色的个体中为污淡黄褐色，后缘下凹的界限隐约可见。盘域刚毛状毛淡褐，细短，较密而近平伏，银白色丝状平伏毛组成毛斑状。小盾片整体抬升，背面观表面较平，侧面观表面向后微升高或较平，在近末端处下降，污灰褐色呈黑褐色，端角黄白；表面具浅横皱，毛同半鞘翅。

半鞘翅污黑褐，斑驳，淡色个体底色污黄褐，革片基半中裂以外的三角形斑及中段一斑黑褐色，端缘区断续地黑褐色；或革片基部延至内缘淡色，中段以后外侧及端角处斑驳地淡色，爪片外缘区域端半淡色；淡色个体全黑。半鞘翅刚毛状毛黑色，粗短，几平伏或半平伏，银白色或褐色丝状平伏毛密，常略弯曲，成方向不同的毛斑状。

前胸侧板及体下方黑褐，腹侧面中央有一宽纵带黄白色；淡色个体全部淡黄褐，腹侧面各节前半有一褐斑。各足股节黑，中、后足胫节基部 $2/5$ 及端部黑，其余黄白；雌虫后足胫节基半或 $2/5$ 黑，末端黑，其余黄白。淡色个体中雌虫足淡黄褐，股节有一至数纵列黑褐色斑，后足胫节色斑同深色个体。雄虫后足股节基段黑色范围大，可占全长的 $4/5$ ，并只渐淡而成污灰褐色。

量度：体长4.5~5.0，体宽（♂）1.92，（♀）2.23。头长0.35~0.38，头宽0.95~1.0，头顶宽（♂）0.40，（♀）0.45。触角各节长（♂）0.75:2.13:0.76:0.55；（♀）0.75:2.13:0.98:0.70。前胸背板长0.80~1.0，后缘宽（♂）1.53，（♀）1.83。革片长2.48~2.75，楔片长0.98~0.10。

模式标本：选模♀，甘肃：Hei-Ho, 1885. VII. 22, Potanin 采（存 ZMAS）（已检

查)。作者按：据采集人工作日志推知，此地点应在目前四川省的九寨沟县（原南坪县）西南部的塔玛（在去松潘县的主要通道上）以北两天路程。

观察标本：6 ♂♂ 19 ♀♀，浙江天目山仙人顶，1965.VIII.15，刘胜利采；1 ♀，浙江杭州，1954.X.27，Borchsenius 采（ZMAS）；5 ♂♂ 3 ♀♀，同前，王良臣采；1 ♂，福建崇安三港，1982.VIII.9，邹环光采；1 ♀，广东连昌，1947.X.2，W. T. Tsang 采；6 ♂♂ 3 ♀♀，广西兴安猫儿山，1300~1500m，1995.VIII.22，郑乐怡采；1 ♂，广西那坡弄化，950m，1998.IV.15，黄复生采；1 ♀，那坡德孚，1350m，2000.VI.21，姚建采；4 ♂♂ 1 ♀，四川峨眉山报国寺，600m，1957.VI.23，郑乐怡、程汉华采；4 ♀♀，四川泸定磨西，2050m，1985.VIII.5，李新正采；1 ♀，贵州贵阳，1000m，1940.VII.11，J. L. Gressitt 采；1 ♂，贵州雷公山，1600~1700m，1983.VII.14，邹环光采；2 ♀♀，贵州习水蔺江，2000.IX.24，800~1000m，周长发采；1 ♀，贵州习水长嵌沟，2000.IX.24，廖启容采；1 ♂，同前，2000.IX.25~28，李子忠采；6 ♂♂ 4 ♀♀，云南武定狮子山，1986.VIII.10；2 ♂♂ 3 ♀♀，同前，2200m，1986.VIII.11（采自豆科山蚂蝗属花序）；1 ♀，陕西北火地塘，1580m，1998.VII.26，姚建采；1 ♂，陕西北旬阳沟，1350m，1998.VII.29，袁德成采；1 ♀（选模），甘肃：Hei-Ho，1885.VII.22，Potanin 采（ZMAS）；1 ♀，甘肃康县，1120m，1986.VIII.6，李新正采。

分布：浙江、福建、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃。

(146) 毛足拟厚盲蝽 *Eurystylopsis hirtipes* Zheng et Lu, 1995（图 77b, d, f;
图 78 c, e, h）

Eurystylopsis hirtipes Zheng et Lu, 1995: 8; Kerzhner & Josifov, 1999: 98.

体长椭圆形，向后略加宽；污灰褐色，杂以污黑褐色斑。背面毛密，毛二型：一种为黑色刚毛状毛，平伏或半平伏，另一种为平伏银色丝状毛，后者极密，有时蓬松，部分鳞片状。

头较前伸，灰褐，具淡褐色泽；毛密，淡色丝状毛多，额部的黑色刚毛状毛向后渐直立；额-头顶区均匀饱满，侧面观额与唇基间不下陷；唇基、上颚片基部、下颚片、以及小颊的上半褐色；颊与眼后区域灰蓝或灰黄色，上颚片大部与小颊的下半红色；头腹面渐成黑褐色。触角污蓝灰色，第Ⅱ节端半红褐色或黑褐色，第Ⅲ节基半与第Ⅳ节基部黄白色；第Ⅱ节向端渐加粗，最粗处约与第Ⅰ节等粗；第Ⅰ、Ⅱ节毛刚毛状，黑，长而粗密，半直立至近直立，长约等于第Ⅰ节的直径；第Ⅲ、Ⅳ节毛淡色，短细，远密于第Ⅱ节毛。喙污褐，伸达后足转节中部，第Ⅰ节伸达中胸腹板中部。

前胸背板领的后缘黑，胝略加深，盘域轻度横皱状，具一黑褐色宽中纵带，前半较粗；侧区与亚侧区有时有一黑褐色宽纵带，常界限不清。领上的黑色刚毛状毛直立，盘域毛平伏，侧区具半直立黑色刚毛状毛。前胸背板前缘略后凹，后缘中段直，侧缘直。