

亚分布型或其他有关类型的组成成分。

(1) 西南山地特有分布：种类甚多，例如：斑角肩盲蝽 *Allorhinocoris splendidus* Zheng、后丽盲蝽属的许多种类 *Apolygus* spp.、毛翅木盲蝽 *Castanopsides dasypterus* (Reuter)、玉龙纹唇盲蝽 *Charagochilus yulongensis* Zheng、黑褐箬盲蝽 *Elthemidea picea* Zheng、四川箬盲蝽 *Elthemidea sichuanense* Zheng、中国拟厚盲蝽 *Eurystylopsis chinensis* Zheng et Chen、棒角拟厚盲蝽 *Eurystylopsis clavicornis* (Jakovlev)、异草盲蝽属的大部分种类 *Heterolygus* spp.、丽盲蝽属的许多种类 *Lygocoris* spp.、棱额草盲蝽 *Lygus discrepans* Reuter、邻棱额草盲蝽 *Lygus paradiscrepans* Zheng et Yu、新丽盲蝽属的许多种类 *Neolygus* spp.、狭毛盾盲蝽 *Onomaus tenuis* Zheng、黄褐奥盲蝽 *Orthops ferrugineus* (Reuter)、纹头奥盲蝽 *Orthops vitticeps* (Reuter)、四川东盲蝽 *Orientalomiris piceus* (Reuter)、植盲蝽属的若干种类 *Phytocoris* spp.、横断异盲蝽 *Polymerus funestus* (Reuter)、狭盲蝽属的若干种类 *Stenodema* spp.、云南纤盲蝽 *Stenotus yunnanensis* Zheng 等；部分种类向东向北伸展，如黑唇厘盲蝽 *Liistonotus melanostoma* (Reuter) 的分布达于鄂西和河北。

(2) 秦岭山地特有分布：包括祁连山东端、甘肃南部与东部山地、秦岭主体以及东部的秦岭余脉地区，北伸可达宁夏六盘山，南伸可达四川。计有：丝绵木后丽盲蝽 *Apolygus evonymi* (Zheng et Wang)、中黑后丽盲蝽 *Apolygus medionigritus* (Zheng et Wang)、斑足乌毛盲蝽 *Cheilocapsus maculipes* Liu et Wang、暗乌毛盲蝽 *Cheilocapsus nigrescens* Liu et Wang、云斑俊盲蝽 *Closterotomus marmoratus* (Lindberg)、狭拟厚盲蝽 *Eurystylopsis angustatus* Zheng et Lu、毛足拟厚盲蝽 *Eurystylopsis hirtipes* Zheng et Lu、邻红唇拟丽盲蝽 *Lygocorides affinis* Lu et Zheng、秦岭狭盲蝽 *Stenodema quilingsensis* Tang。

(3) 湘、鄂与粤、桂北部山地特有分布：计有：斑驳异丽盲蝽 *Apolygopsis mosaicaus* (Zheng et Wang)、扇斑异丽盲蝽 *Apolygopsis picturatus* (Zheng et Wang)、斑后丽盲蝽 *Apolygus ornatus* (Zheng et Wang)、弯胫后丽盲蝽 *Apolygus curvipes* (Zheng et Wang)、三角后丽盲蝽 *Apolygus triangulus* (Zheng et Wang)、狭长树丽盲蝽 *Arbolygus longustus* Lu et Zheng、露腹混毛盲蝽 *Heteropantilius rhopalomorphus* Zheng et Liu、金秀混毛盲蝽 *Heteropantilius jiuxiuensis* Wang et Liu、卡氏水杉盲蝽 *Metasequoiamiris carvalhoi* Schwartz、中黑水杉盲蝽 *Metasequoiamiris mediovittatus* Zheng、神农新丽盲蝽 *Neolygus shennongensis* (Lu et Zheng)、秀色毛盾盲蝽 *Onomaus coloratus* Zheng et Liu、峰盾盲蝽 *Peltidolygus scutellaus* (Yasunaga et Lu)。

(4) 浙、闽山地分布：已知计有：角斑后丽盲蝽 *Apolygus concinnus* (Wang et Zheng)、黑后丽盲蝽 *Apolygus nigricans* (Wang et Zheng)、香榧硕丽盲蝽 *Macrolygus torreyae* Zheng、武夷新丽盲蝽 *Neolygus wuyiensis* (Lu et Zheng)、黑头东盲蝽

*Orientomiris pseudopronotalis* (Li et Zheng)。

## 12. 西藏特有分布

已知的种类多分布于西藏东南部, 计有: 黑缘后丽盲蝽 *Apolygus nigricostalis* (Lu et Zheng)、张氏树丽盲蝽 *Arbolygus zhangii* Lu et Zheng、单纹异草盲蝽 *Heterolygus univittatus* Zheng et Yu、亚东异草盲蝽 *Heterolygus yadongensis* Zheng et Yu、萧氏草盲蝽 *Lygus hsiaoi* Zheng et Yu、西藏草盲蝽 *Lygus tibetanus* Zheng et Yu、韩氏新丽盲蝽 *Neolygus hani* Lu et Zheng、山地新丽盲蝽 *Neolygus monticola* Lu et Zheng、西藏新丽盲蝽 *Neolygus xizangensis* (Lu et Zheng)、瘦狭盲蝽 *Stenodema angustata* Zheng、毛角狭盲蝽 *Stenodema antennata* Zheng、西藏狭盲蝽 *Stenodema tibetum* Zheng。

## 13. 中国大陆南部特有分布

此分布型包括在我国大陆长江以南分布较广泛的特有种类。计有: 大隆胸盲蝽 *Bertsia major* Zheng、淡领纹唇盲蝽 *Charagochilus pallidicollis* Zheng、乌毛盲蝽 *Cheilocapsus tibetanus* (Reuter)、灰黄厚盲蝽 *Eurystylus luteus* Hsiao、中国肿角盲蝽 *Guisardus chinensis* Carvalho et Gross、立毛东盲蝽 *Orientomiris erectus* Zheng、斑胸东盲蝽 *Orientomiris pronotalis* (Li et Zheng)、山地狭盲蝽 *Stenodema alpestris* Reuter、深色狭盲蝽 *Stenodema elegans* Reuter。

## 14. 中国大陆南端 + 台湾分布

此分布型的种类为我国大陆处于南亚热带、热带北缘的云南南部、广西南部、广东南部、海南等地与台湾共同分布的特有种。计有: 大眼瘦盲蝽 *Acomocera glandiocola* Lin、斑胸树丽盲蝽 *Arbolygus pronotalis* (Zheng et Liu)、台湾厚盲蝽 *Eurystylus sauteri* Poppius、斑纹毛盲蝽 *Lasiomiris picturatus* Zheng、台湾巨室盲蝽 *Macrolonius schenklingi* (Poppius)、异斑新丽盲蝽 *Neolygus disciger* (Poppius)、黑盾新丽盲蝽 *Neolygus nigroscutellaris* Lu et Zheng、大黑沟顶盲蝽 *Megacoelum formosanum* (Poppius)、邵氏萨盲蝽 *Sabactiopis sauteri* (Poppius)、红褐狭盲蝽 *Stenodema longicollis* Poppius。

## 15. 云南南部特有分布

计有: 云南异丽盲蝽 *Apolygopsis yunnananus* (Zheng et Wang)、勐海长盲蝽 *Dolichomiris menghaiensis* Tang et Liu、毛角长盲蝽 *Dolichomiris hirticornis* Zheng、瘤颚拟肿角盲蝽 *Guisardinus bui* Zheng、紫褐毛盲蝽 *Lasiomiris purpurascens* Zheng、南方新丽盲蝽 *Neolygus meridionalis* Lu et Zheng、拟红颊新丽盲蝽 *Neolygus subrufilori* Lu et Zheng、云南东盲蝽 *Orientomiris yunnananus* (Li et Zheng)、邹氏东盲蝽