

3. 前胸背板具一对红色或红褐色宽纵带 赤条纤盲蝽 *S. rubrovittatus*
 前胸背板抵后无红色或褐色宽纵带。小盾片基半橙红。头窄长 长头纤盲蝽 *S. longiceps*
4. 体长在 4.5mm 左右。体黄褐或黄绿色，身体在小盾片两侧及后方不形成宽黑中纵带 5
 体长在 6.0mm 左右。身体在小盾片两侧及后方形形成宽黑中纵带
 云南纤盲蝽，新种 *S. yunnananus* sp. nov.
5. 革片端缘内侧有一大褐斑。头在眼后无黑纵带 台湾纤盲蝽 *S. insularis*
 革片内角深褐。头在眼后有一黑纵带 绿纤盲蝽 *S. viridis*

(338) 台湾纤盲蝽 *Stenotus insularis* Poppius, 1915

Stenotus insularis Poppius, 1915a: 17; Carvalho, 1959: 255; Carvalho, 1980: 656; Schuh, 1995: 949;
 Kerzhner & Josifov, 1999: 178.

作者未见此种标本，现据文献整理描述如下：

体长椭圆形，黄褐色，具光泽；毛淡色，平伏而短。

头几乎伸，微下倾；背面观长度略大于宽；唇基以及头两侧前部褐色；唇基前伸；雌虫头顶宽约为眼宽的 2 倍。触角黄，第 I 节褐，短于头长约 1/3；第 II 节长约为第 I 节之 3 倍；后两节之和约与第 II 节等长；第 IV 节短于第 III 节约 1/3。喙伸过后足基节末端。

前胸背板轻度前倾，饱满但较平，长度短于后缘宽约 1/3；后缘宽于前缘约 2 倍；盘域具细横皱；侧缘略凹弯。小盾片亦具细横皱。革片端缘内侧的一个大斑褐色；膜片灰黄。足黄，基节前部黑褐色。后足股节红褐。

前胸侧板上的纵带黑褐色，中胸腹板两侧的纵带黑褐。腹下两侧纵带褐色。

体长 4.5mm，体宽 1.3mm。

模式标本：台湾台南县安平（存 HNHM）（未检查）。

分布：台湾。

(339) 长头纤盲蝽 *Stenotus longiceps* Poppius, 1915

Stenotus longiceps Poppius, 1915a: 18; Carvalho, 1959: 256; Carvalho, 1980: 657; Schuh, 1995: 949; Kerzhner & Josifov, 1999: 178.

作者未见此种标本，现据文献整理描述如下：

体黄色，长椭圆形，具光泽；毛淡色，平伏。

头长而前伸，略下倾；黄褐色，头两侧各有一黄斑与一黄色纵纹，后者伸达唇基；头顶宽约为眼宽的两倍；唇基前伸。触角第 I 节褐色，粗，短于头长约 1/3，第 II 节黄，端部加深成黄褐色，长为第 I 节的 3 倍以上。喙远伸过后足基节。

前胸背板轻度前倾，盘域饱满，具细密横皱；抵黄褐；侧缘几直；背板长度短于后

缘宽约 $1/4$ ；后缘宽约为前缘的两倍。小盾片橙红色，端半及一中纵纹黄色；具不明显的横皱。半鞘翅具较前胸背板明显而且稀疏的横皱；爪片除接合缘与末端以外为红褐色；革片后半内方、以及楔片除基部与外缘外为红色。膜片污灰黑色，脉红。

足黄，股节红褐，胫节外端黑褐。

前胸侧板各侧具两条平行的红褐色纵带。腹下红褐色，中央淡黄。

体长 5mm，体宽 2mm。

与 *S. insularis* 相似，但头明显较狭而且伸长，触角第 I 节较粗，第 II 节明显较长，喙较长，前胸背板较窄。

模式标本：台湾台南县安平（存 HNHM）（未检查）。

分布：台湾。

(340) 小纤盲蝽 *Stenotus pygmaeus* Poppius, 1915

Stenotus pygmaeus Poppius, 1915a: 19; Carvalho, 1959: 256; Carvalho, 1980: 657; Schuh, 1995: 950; Kerzhner & Josifov, 1999: 178.

作者未见此种标本，现据文献整理描述如下：

体长椭圆形，灰黄色，有光泽。

头几乎伸，背面观长于宽；雄虫头顶宽于眼宽约 $1/3$ ，末端以及眼后的纵带黑褐色，此带向后延续，达前胸背板后缘并加宽。触角第 I 节黑褐，粗，略短于头顶宽与一眼宽之和；第 II 节长于第 I 节的 3 倍；第 III 节长不足第 II 节之半，略长于第 IV 节。喙伸达后足基节末端。

前胸背板饱满，但背面较平，轻度前倾，具细密横皱；背板长度短于后缘宽约 $1/3$ ，后缘宽约为前缘宽的 3 倍，侧缘微凹弯。小盾片平，基部黑褐色。半鞘翅表面皱刻同前胸背板，爪片除外侧与末端外黑褐色，革片端缘内方有一黑褐色斑。膜片黑褐。后足股节具淡色末端。胫节刺淡色。

体下方黑褐色。

体长 3mm，体宽 1mm。

体极小以及体色特点为此种的特色。

模式标本：正模♂，台湾台南县安平（存 HNHM）（未检查）。

分布：台湾。

(341) 赤条纤盲蝽 *Stenotus rubrovittatus* (Matsumura, 1913) (图版 VII-14)

Calocoris rubrovittatus Matsumura, 1913: 181; Carvalho, 1959: 47.

Stenotus rubrovittatus (Matsumura): Linnavuori, 1961c: 157; Hsiao & Meng, 1963: 442; Schuh, 1995: 950; Kerzhner & Josifov, 1999: 178.