

缘宽约 1/4；后缘宽约为前缘的两倍。小盾片橙红色，端半及一中纵纹黄色；具不明显的横皱。半鞘翅具较前胸背板明显而且稀疏的横皱；爪片除接合缘与末端以外为红褐色；革片后半内方、以及楔片除基部与外缘外为红色。膜片污灰黑色，脉红。

足黄，股节红褐，胫节外端黑褐。

前胸侧板各侧具两条平行的红褐色纵带。腹下红褐色，中央淡黄。

体长 5mm，体宽 2mm。

与 *S. insularis* 相似，但头明显较狭而且伸长，触角第 I 节较粗，第 II 节明显较长，喙较长，前胸背板较窄。

模式标本：台湾台南县安平（存 HNHM）（未检查）。

分布：台湾。

(340) 小纤盲蝽 *Stenotus pygmaeus* Poppius, 1915

Stenotus pygmaeus Poppius, 1915a: 19; Carvalho, 1959: 256; Carvalho, 1980: 657; Schuh, 1995: 950; Kerzhner & Josifov, 1999: 178.

作者未见此种标本，现据文献整理描述如下：

体长椭圆形，灰黄色，有光泽。

头几乎伸，背面观长于宽；雄虫头顶宽于眼宽约 1/3，末端以及眼后的纵带黑褐色，此带向后延续，达前胸背板后缘并加宽。触角第 I 节黑褐，粗，略短于头顶宽与一眼宽之和；第 II 节长于第 I 节的 3 倍；第 III 节长不足第 II 节之半，略长于第 IV 节。喙伸达后足基节末端。

前胸背板饱满，但背面较平，轻度前倾，具细密横皱；背板长度短于后缘宽约 1/3，后缘宽约为前缘宽的 3 倍，侧缘微凹弯。小盾片平，基部黑褐色。半鞘翅表面皱刻同前胸背板，爪片除外侧与末端外黑褐色，革片端缘内方有一黑褐色斑。膜片黑褐。后足股节具淡色末端。胫节刺淡色。

体下方黑褐色。

体长 3mm，体宽 1mm。

体极小以及体色特点为此种的特色。

模式标本：正模♂，台湾台南县安平（存 HNHM）（未检查）。

分布：台湾。

(341) 赤条纤盲蝽 *Stenotus rubrovittatus* (Matsumura, 1913) (图版 VII-14)

Calocoris rubrovittatus Matsumura, 1913: 181; Carvalho, 1959: 47.

Stenotus rubrovittatus (Matsumura): Linnavuori, 1961c: 157; Hsiao & Meng, 1963: 442; Schuh, 1995: 950; Kerzhner & Josifov, 1999: 178.

体长椭圆形，红锈色或红褐色，具光泽。

头平伸，额-头顶区饱满，被短小而密的淡色毛，红至红褐色，中线处黄色，成宽纵带状，唇基黑色；头顶中纵沟不可辨或极浅，该处常略下凹。触角第Ⅰ节红褐，略短于头宽，约有一半伸过头端；第Ⅱ~Ⅳ节淡红褐，线形，第Ⅱ节粗约为第Ⅰ节之半，第Ⅲ、Ⅳ节略细于第Ⅲ节。喙伸达后足基节中部。

前胸背板底色黄，具光泽，两侧各具一红色、红褐或褐色宽纵带，起自领侧，向后渐宽，覆盖胫区外半，伸达背板后缘。背板平置，几不前倾，后缘中段平直，侧缘近直，仅微凹弯；侧面观前胸背板侧缘较钝圆；半鞘翅基外角略伸出前胸背板之外；盘域具细密明显刻皱，毛短密，几乎伏；胫略隆出，界限清楚，被毛，与盘域同，无刻皱；胫间区略隆出，具刻皱。小盾片平，中央为黄色两侧平行的宽条状，两侧宽阔地红褐色。半鞘翅淡黄，爪片红色或红褐色，外侧沿爪片缝的窄条常为淡黄，革片内角区域或内半红或红褐，伸达楔片内角，此区域的外缘常为纵走直线状；毛短密，平伏，略弯而有闪光。膜片淡烟色，脉红色。

各足股节红，胫节淡黄，胫节刺淡黄褐，微带红色。

体下方淡黄，有光泽，侧方有红褐色宽带贯全长。

量度 (mm)：体长 4.25~5.63，体宽 1.45~1.90。头长 0.65，头宽 0.93，头顶宽 (♂) 0.43，(♀) 0.37。触角各节长 0.60:2.00:1.15:0.85。前胸背板长 0.80，后缘宽 1.55。革片长 2.80，楔片长 0.75。

观察标本：1 ♂ 8 ♀♀，河北北戴河，1971.VIII.14；6 ♀♀，吉林高岭子，1939.IX.1；1 ♀，河南安阳，1954.VIII.(玉米)；1 ♀，江苏南京，付胜发采；3 ♂♂ 5 ♀♀，江西九江，1954.IX.(小米)；2 ♂♂，湖北江陵，1960.VII.；1 ♀，湖北武昌珞珈山，1957.VIII.11，应松鹤采；2 ♂♂ 8 ♀♀，云南瑞丽弄岛，1979.VIII.28，郑乐怡采；1 ♂ 1 ♀，陕西汉中，1963.VIII.2。

分布：河北、吉林、河南、江苏、江西、湖北、云南、陕西；日本，韩国，俄罗斯(远东地区)。

(342) 绿纤盲蝽 *Stenotus viridis* (Shiraki, 1913)

Tancredus viridis Shiraki, 1913: 186, 187.

Stenotus viridis (Shiraki): Carvalho, 1959: 257; Schuh, 1995: 951; Kerzhner & Josifov, 1999: 178.

作者未见此种标本，现据原描述 (Shiraki, 1913) 摘记如下：

体淡绿色。

头及触角淡黄绿色，几平伸。触角第Ⅲ、Ⅳ节淡褐色。喙伸达后足基节末端。眼后具黑色纵带。

前胸背板侧缘略呈淡褐色，亚后缘区呈褐色横带状，侧缘略弯。