

直至腹末。足同体色，股节亚端部具2个浅褐色环，胫节刺略深于体色。

两性外生殖器构造见属征描述及图217。

量度 (mm): 体长 4.24~5.67, 体宽 1.60~2.21。头长 0.27~0.32, 头宽 1.02~1.12。触角各节长 0.41~0.55: 1.57~2.04: 0.83~0.99: 0.52~0.61。前胸背板长 0.69~0.85, 后缘宽 1.42~1.71。革片长 1.98~2.77, 楔片长 0.68~0.99。

观察标本: 360 头; 采集地如下: 浙江: 庆元百山祖, 1100~1650m、江山龙井。江西: 庐山、莲塘。湖北: 武昌南湖、武昌珞珈山。湖南: 张家界。福建: 将乐、邵武、崇安、建阳黄坑、福州。广东: 连县瑶安、广州白云山。广西: 兴安猫儿山、陇瑞、凭祥友谊关、龙州、睦南关、南宁、桂林、上林、阳朔、龙胜花坪。四川: 丰都、峨眉山九老洞、金川。贵州: 贵阳、兴义、梵净山。云南: 瑞丽、丽江、勐腊尚勇、思茅、景洪、潞西芒市、金平河头寨。西藏: 易贡; 台湾: 台北、基隆、阿里山。

分布: 浙江、江西、湖北、湖南、福建、广东、广西、四川、贵州、云南、西藏、台湾; 日本, 太平洋岛屿, 大洋洲, 欧洲, 非洲, 北美, 南美。

(345) 斑胸泰盲蝽 *Tailorilygus ornatcollis* (Reuter, 1908)

Lygus ornatcollis Reuter, 1908b: 189; Poppius, 1915: 30; Carvalho, 1959: 125; Carvalho, 1980: 653; Schuh, 1999: 820.

Tailorilygus ornatcollis (Reuter); Schwartz & Kerzhner, 1997: 256; Kerzhner & Josifov, 1999: 180.

淡黄褐色或淡灰黄色。毛淡色，密。

头垂直，光滑，毛极短；头的眼前部分短小；淡灰黄色，唇基、上颚片及下颚片有时染有红色，额两侧具5对平行横纹；头顶前部有一红色横纹，中纵沟明显，向后向两侧逐渐略分歧，其间区域略下陷，后缘嵴完整均一，后缘宽约与眼宽相等。触角淡黄褐，第Ⅰ节较细，伸过头端；第Ⅱ节细长，线形，雄明显长于前胸背板宽，最基部及端部1/4黑褐，微细于第Ⅰ节；第Ⅲ节亦长，黑，最基部白色；第Ⅳ节黑。触角毛中，丝状毛极短小而甚密，平伏；刚毛状毛短小，稀疏。喙略伸过中足基节末端。

前胸背板均匀饱满，略前倾；淡黄褐，侧缘锈褐色，盘域具4条橙褐色至锈褐色纵带，内方一对向前渐细，在胝间相互接触，然后沿胝前内缘斜伸向领；毛短小，平伏，刻点细密，相互几接触，呈浅点皱状，均匀；领清楚，两侧部分被眼遮盖；刻点细浅。小盾片中央具一对略平行或略向外弯的红褐或锈褐色带纹，侧缘处亦加深成红褐色纵带纹，这些纵带常后半渐消失。半鞘翅淡黄褐或淡灰黄褐，半透明；爪片中部渐加深成灰褐色或褐色；革片内半亦略深成褐色，在内角附近可成模糊的大斑状，或沿爪片缝处后半常成一模糊的褐色纵带状，基内侧模糊地加深，革片外端角区域及楔片内角前方区域加深成黑褐斑状；爪片与革片毛一型，刚毛状，几平伏，淡黄褐色，几同底色，密，长度中等，明显短于前种；刻点密浅。楔片灰黄，略成半透明，端缘色略深。膜片灰黑

褐，二室后缘宽阔地加深成黑褐，楔片端后有一小黑斑。

胸下淡橙褐色。腹下黄白，侧方具橙红色宽纵带，斑驳，其中在侧面中央有一红色较细的纵带贯全长。足淡黄褐，股节亚端部有两个锈褐色或褐色斜环，中、后足股节最末端亦成褐色窄环状；胫节刺黄褐色，刺基有一很小的黑色点斑。

量度 (mm)：体长 4.5，宽 1.63。头长 0.25，头宽 1.08，头顶宽 0.25。触角各节长 0.53:1.88:1.50:0.55。前胸背板长 0.75，后缘宽 1.75。革片长 2.18，楔片长 0.70。

观察标本：1 ♂，云南思茅菜阳河保保新寨山，1500m，2000.V.20，卜文俊采；1 ♂，同前，2000.V.19。

中国其他记录：台湾南投县集集 (Poppius, 1915)。

分布：云南、台湾；印度尼西亚 (爪哇)。

69. 瘤獐盲蝽属 *Tinginotopsis* Poppius, 1915

Tinginotopsis Poppius, 1915a: 23. **Type species:** *Tinginotopsis dromedarius* Poppius 1915 (= *Lygus oryzae* Matsumura, 1910); by monotypy.

与獐盲蝽属 (*Tinginotum* Kirkaldy) 相似，Poppius (1915) 主要根据前胸背板具一瘤状构造的特点与前者不同而建立此属。Carvalho (1959) 曾怀疑为 *Tinginotum* 属的异名，但在其后来的工作中则认为仍应视为独立的属 (Carvalho, 1987)。Yasunaga (1999) 认为此属除前胸背板盘域有一显著的瘤突可为鉴别特征外，其他方面与 *Tinginotum* 属几无区别。

据 Poppius (1915) 原描述，前胸背板盘域瘤突与侧角区之间有一凹痕，瘤突本身光滑无刻点。

世界已知 4 种 (Schuh 1995)。我国已知 1 种，记录于台湾。

(346) 瘤獐盲蝽 *Tinginotopsis oryzae* (Matsumura, 1910)

Lygus oryzae Matsumura, 1910: 22.

Tinginotopsis oryzae (Matsumura): Yasunaga, Miyamoto & Kerzhner, 1996: 93; Kerzhner & Josifov, 1999: 181.

Tinginotopsis dromedarius Poppius, 1915a: 24. Synonymized by Yasunaga, Miyamoto & Kerzhner, 1996: 93.

Tinginotum dromedarius Poppius: Carvalho, 1959: 267; Schuh, 1995: 964.

作者未见标本，现摘译原描述如下：

头黄，头顶中纵沟以及略向前伸的色斑褐色，前胸背板与小盾片褐色。前胸背板瘤突黄褐色，后缘狭窄地黄色。小盾片端部黄白色。爪片、革片端部 1/3、以及楔片末端黑褐色。爪片外缘狭窄地黄褐色，革片基部、端外角以及楔片黄白色半透明，楔片内缘