




图 95 程氏丽盲蝽 *Lygocoris chengi* Lu et Zheng

a~c. 左阳基侧突 (left paramere); d, e. 右阳基侧突 (right paramere); f, g. 阳茎端 (vesica)。

量度 (mm): 体长 5.74 ~ 6.86, 体宽 2.21 ~ 2.48。头长 0.35 ~ 0.41, 宽 0.97 ~ 1.04, 头顶宽 (♂) 0.40, (♀) 0.44。触角各节长 0.68 ~ 0.78: 1.84 ~ 2.02: 1.19 ~ 1.38: 1.46 ~ 1.61。前胸背板长 0.94 ~ 1.16, 后缘宽 1.80 ~ 2.14。革片长 2.52 ~ 3.08, 楔片长 0.99 ~ 1.19。

模式标本: 正模♂, 四川峨眉山九老洞, 1800m, 1967. VII. 3, 郑乐怡、程汉华采 (存 NKU) (已检查)。

观察标本: 1 ♂ (正模), 四川峨眉山九老洞, 1800m, 1967. VII. 3, 郑乐怡、程汉华采; 2 ♂♂ 7 ♀♀, 同前; 2 ♂♂ 4 ♀♀, 同前, 1957. VIII. 4; 3 ♂♂ 7 ♀♀, 同前, 1957. VIII. 10。

分布：四川。

相似于广西丽盲蝽 *L. guangxiensis*，但头顶较宽，小盾片平滑无横皱，右阳基侧突及阳茎端结构不同。

(173) 晕斑丽盲蝽 *Lygocoris diffusomaculatus* Lu et Zheng, 2001 (图 96, 图版 V-1)

*Lygocoris (Lygocoris) diffusomaculatus* Lu et Zheng, 2001: 126~128.

雄虫体长形，两侧平行；雌虫长椭圆形；背面浅绿至黄褐色；具黄褐色毛。

头略前倾，浅黄褐色；雄头顶宽为头宽的 0.32 倍，雌为 0.40 倍；头顶后缘嵴完整，但中段较弱；唇基与头同色。触角第 I、II 节黄褐，第 II 节端部 1/5~1/3 深褐；第 III、IV 节深褐。喙伸达后足基节。

领黄白至黄褐。前胸背板浅绿至黄褐，如为绿色，则胝区及胝前区多为黄色；盘域刻点较大，具横皱，毛密；胝较饱满，胝间区略低于胝，胝的内缘痕印状。小盾片微隆起，同体色；具横皱。革片基半部浅黄绿色，端半部除最末端为绿色或黄褐色外，加深为浅褐色晕状大斑，深色部分上的毛为黑褐色，浅色部分上的毛为黄褐色；刻点细密且浅。爪片端部内侧褐色，毛色变化同革片。楔片长约为基部宽的 2.0 倍。膜片淡烟褐色，翅室内端部褐色，室外侧有一环状或半环状的褐色斑；翅脉浅绿色至黄褐色。体下黄白至黄褐色。足黄褐；胫节刺黄褐。

左阳基侧突感觉叶强烈扩展，端突呈扭结状。右阳基侧突感觉叶略向前扩展，端突短，直。阳茎鞘片状突狭长形，末端尖。阳茎端针突基半部甚粗，端半部突然变细，明显弯曲；其余构造如图 96f~g。

量度 (mm)：体长 6.02~6.44，体宽 1.87~2.07。头长 0.27~0.37，头宽 0.94~1.02，头顶宽 (♂) 0.34，(♀) 0.43。触角各节长 0.72~0.83 : 2.27~2.39 : 1.52~1.87 : 0.74~0.85。前胸背板长 0.95~1.12，后缘宽 1.69~1.90。革片长 2.84~2.92，楔片长 0.99~1.09。

模式标本：正模 ♂，甘肃榆中兴隆山，2200m，1993. VIII. 2，吕楠采（存 NKU）（已检查）。

观察标本：1 ♂（正模），甘肃榆中兴隆山，2200m，1993. VIII. 2，吕楠采；2 ♀♀，同前；8 ♂♂ 9 ♀♀，甘肃榆中麻家寺，2200m，1993. VIII. 4，吕楠、卜文俊采；5 ♂♂，湖北神农架大岩屋，1977. VI. 27，郑乐怡采；5 ♂♂ 3 ♀♀，湖北神农架红坪，1977. VII. 1，穆强采。

分布：湖北、甘肃。

与 *L. rugosicollis* (Reuter) 相似，但体较小，革片具褐色斑，翅脉绿或黄褐色。




图 96 晕斑丽盲蝽 *Lygocoris diffusomaculatus* Lu et Zheng

a~b. 左阳基侧突 (left paramere); c~d. 右阳基侧突 (right paramere); e. 阳茎鞘片状突 (tab of theca);  
f~g. 阳茎端 (vesica)。

(174) 淡色丽盲蝽 *Lygocoris dilutus* Lu et Zheng, 2001 (图 97)

*Lygocoris* (*Lygocoris*) *dilutus* Lu et Zheng, 2001: 128.

体略长；黄绿至浅黄褐色，无深色斑；具黄褐色毛。

头垂直，黄褐色，通常略带红色，略具光泽；雄头顶宽为头宽的 0.34 倍，雌虫为 0.46 倍；头顶后缘嵴完整，中纵沟浅；唇基与头同色。触角第 I、II 节黄褐，第 II 节端部 1/4 深褐；第 III、IV 节深褐。喙伸过后足基节。前胸背板相对短平，前倾程度较弱，表面点皱状，刻点较细密，较浅，向外渐粗密，浅黄褐；胫色略深，淡橙褐色，略