

图 114 邻棱额草盲蝽 *Lygus paradiscrepans* Zheng et Yu

- a. 身体色斑 (body color pattern); b (1~9) . 前胸背板色斑 (pronotum color pattern);
 c (1~2). 小盾片色斑 (scutellum color pattern); d. 阳茎端 (vesica); e. 小膜叶 (small lobe of vesica);
 f. 针突 (spicule); g. 大膜叶 (large lobe of vesica); h~i. 左阳基侧突 (left paramere);
 j~k. 右阳基侧突 (right paramere)。

小金, 2800m, 1985. VIII. 14, 李新正采; 1 ♂, 云南丽江, 1979. VIII. 1, 崔剑昕采;
 3♀♀, 云南玉龙山, 2760m, 1979. VIII. 1, 刘国卿采; 1 ♂, 云南丽江象山, 1979. VIII. 5,
 凌作培采; 1♀, 云南丽江玉龙山, 2900m, 1979. VIII. 12, 郑乐怡采; 1 ♂, 云南丽江象
 山, 2900m, 1979. VIII. 12, 郑乐怡采; 1 ♂, 云南丽江玉峰寺, 1979. VIII. 13, 刘国卿采;

2♂♂，云南丽江玉龙山，2800m，1979.VII.13，郑乐怡采；2♂♂4♀♀，云南玉龙山脚下，1979.VII.14，刘国卿采；1♂9♀♀，云南丽江玉龙山，2700m，1979.VII.15；1♀，西藏吉隆公社，1984.VII.30，闫兆兴采；2♂♂，西藏吉隆宗成，1984.IX.18，闫兆兴采；1♂，西藏吉隆公社，1984.IX.28，闫兆兴采；2♀♀，西藏吉隆宗成，1984.IX.28，闫兆兴采；1♂1♀，西藏吉隆县、区，1984.X.4，普琼琼采；1♂，陕西宁陕旬阳坝，1350m，1998.VII.29，袁德成采；1♀，陕西宁陕火地塘，1580m，1998.VII.17，灯诱，袁德成采；1♀，陕西秦岭山梁及北坡，2050m，1998.VII.30，姚建采；1♂，甘肃舟曲沙滩林场，2400m，1999.VII.17，王洪建采；1♂♂2♀♀，同前，1999.VII.16，王洪建采；1♂，同前，1999.VII.14，朱朝东采；1♂3♀♀，同前，姚建采；1♂，同前，贺同利采；1♂，甘肃宕昌大河坝沟，1700~2300m，1998.VII.9，陈军采；3♂♂，同前，姚建采；1♂，甘肃文县邱家坝，2350m，1999.VII.21，王洪建采；1♂，同前，2200~2350m，1998.VII.21，王书永采；1♂，甘肃康县黑马关，1450~1550m，1998.VII.13，陈军采；2♀♀，甘肃康县，1120m，1986.VIII.2，李新正采；2♂♂，甘肃天水麦积山，1650m，1986.VIII.5，李新正采；1♀，甘肃敦煌千佛洞，1200m，1986.VIII.10，李新正采。

分布：四川、云南、西藏、陕西、甘肃。

本种近似 *L. discrepans*，以下几点特征可以区别：具光泽；额区光滑无棱纹；爪片内半全为黑色；两性腹部腹面全为黄色或黄绿色；股节除端部2黑色环外，无其他深色斑。

(197) 狹長草盲蝽 *Lygus poluensis* (Wagner, 1967)

Exolygus poluensis Wagner 1967: 123.

Lygus poluensis (Wagner): Zheng & Yu, 1992: 353; Zheng & Ren, 1996: 43; Schwartz & Foottit, 1998: 315; Schuh, 1995: 821; Kerzhner & Josifov, 1999: 121.

Wagner (1967) 根据采自新疆 Polu (可能为博乐县——作者按) 附近的“Saiback”的标本 (共5雄2雌) 记述此种。现据存于德国洪堡大学动物博物馆的正模 (雄) 及一头雌性副模标本描述如下：

正模 (♂)：

体长椭圆形，两侧近平行。体色为较淡的污黄褐色，前胸背板盘域与半鞘翅下方透出的部分略带青色色泽。

头顶似为一色，因污物粘附以致不能看清，但中线处似无明显的深色纵纹或斑；前面观可见头顶后缘前有一小褐斑，沿眼内缘有一不甚明显的褐纹。雄头顶狭于眼 (0.9:1)，雌头顶略宽于眼 (1.07:1)。触角黄褐，略深于头顶，几为一色；第Ⅰ节腹面淡褐，最末端色略深；第Ⅱ节基段极微弱地加深，近末端处略加深；第Ⅲ、Ⅳ节缺；触