

色；膜片污褐色。胸部下方以及腹下具黄斑。足黄，胫节具若干褐色斑，胫节刺褐色。体长5mm，宽1.5mm。

模式标本：正模♂，台湾高雄（存HNHM）（未检查）。

分布：台湾。

47. 纹翅盲蝽属 *Mermitelocerus* Reuter, 1908

Mermitelocerus Reuter, 1908a: 489. Type species: *Mermitelocerus annulipes* Reuter, 1908; by monotypy.

体中大型，狭长，两侧平行。光泽弱。绿色（干标本黄褐色），具黑色斑纹。毛一型，刚毛状，黑色。眼不接触前胸背板领，侧面观眼的上端高出头顶。触角窝位于眼内缘的下部2/5处，其下端略伸过眼的下端。唇基与额间有一浅横缢。头顶后缘无嵴。触角第Ⅰ节较粗长，第Ⅱ节向端渐粗，亚棒状至棒状。喙较短，仅伸达中足基节。

前胸背板领明显，较粗，具毛。胝界限较明显，侧端不伸达背板前角，二胝不相连；领及胝区低平，胝后的区域则明显升高，圆隆饱满；背板侧缘前部呈弱棱边状，向后渐钝圆。半鞘翅侧缘直，后部下折不强。足较细长。跗节第Ⅰ跗分节最短，长约为第Ⅱ跗分节之半；第Ⅱ、Ⅲ两节约等长。

阳茎端不对称，左膜叶较大，右膜叶具小形微刺区。左阳基侧突的端突弧弯，背缘有一突起，感觉叶端部成齿状（Rosenzweig 1997）。

古北界分布。世界已知3种，我国记录1种。

此属曾置于*Calocoris* Fieber属中，为该属的亚属之一。Rosenzweig（1997）将其提升为独立属。因体形狭长且前翅具黑色条纹而与*Rhabdomiris* Wagner属外观相似，易于混淆；可据体毛性质、触角第Ⅰ节的毛被、第Ⅱ节是否棒状、领是否有毛、胝是否伸达前胸前角等区别之。

（210）纹翅盲蝽 *Mermitelocerus annulipes* Reuter, 1908

Mermitelocerus annulipes Reuter, 1908a: 490; Carvalho, 1959: 163; Schuh, 1995: 837; Kerzhner & Josifov, 1999: 126.

体狭长，两侧平行。略具光泽。底色鲜绿，干标本黄褐至深黄褐，具黑色斑纹；毛黑色，短。

头较宽短，眼相对较大，明显伸出于前胸背板前部之外。额饱满程度较弱，平行横纹只可辨痕迹，额前部中央成一低锥状圆钝地隆起；头顶中部具略为下凹的宽带状微刻区，成“x”形宽带状，头顶后部略下凹，微呈颈状。侧面观唇基基半轻微前隆。头部毛淡色，较细密。淡色个体中，头的底色黄绿或黄褐，额具若干黑褐色平行横纹，唇基

背面黑，头顶中纵带（1条或2条）黑色；深色个体中，头部底色黑，额中央一黄色椭圆形小斑，触角窝内侧一小斑以及沿眼内缘及前、下缘的宽带淡黄褐。触角第Ⅰ节粗长，淡红褐色至黑色，被整齐的浓密的粗黑色半直立毛；第Ⅱ节亚棒状，长，基部 $2/3$ 淡色而其余黑，直至全部黑色不等，毛短小而密，色较淡；第Ⅲ、Ⅳ两节线形，污黑褐色，第Ⅲ节基部渐淡。喙伸达中胸腹板后缘。

前胸背板领粗，约与触角第Ⅱ节端部等粗，背面全黄，或只部分黄色而其余黑色；盘域底色绿或黄褐，盘域前的部分在淡色个体中只胝缘断续地黑色；深色个体中几全黑，仅前缘中央及两侧在胝前各有一小黄斑，胝上有一小黄斑；盘域侧缘宽带黑，淡色个体只侧缘后半如此；各胝后有一黑色纵带，深色个体伸达后缘区中段两侧的大黑斑，成连续的宽纵带状，淡色个体则只伸达盘域中部；后缘区黑斑可横列而小，或无。盘域圆隆饱满，具不规则的粗皱刻，毛基部具细刻点；毛短小，黑，半直立，较密。背板侧缘直，侧角圆钝，宽阔地微翘起。

小盾片淡黄绿或淡锈黄色，基缘、基角及侧缘前半黑色，基缘黑色部分有时中央有一对短纵纹向后伸出；表面较光滑，侧区横皱明显。

半鞘翅绿或污黄褐，侧缘直；爪片各缘狭细地黑褐色，爪片具粗皱刻；革片外缘以及由此缘中央向内后方发出并渐与前者平行的一条细纹黑褐色，爪片内半的一部分常成深色；革片中部的斜纵带淡黑褐，起自前部，向后渐宽，伸达革片端缘的内半，革片表面具皱刻，浅于爪片，不规则，粗糙，似不具明显的刻点；半鞘翅毛似前胸背板，但较长，半平伏。楔片淡黄白，末端黑褐，基外角浅黑褐。膜片烟黑褐，脉黄。

足细长，淡污褐色；股节具碎褐斑；后足股节背面深褐至淡黑褐；后足胫节刺黑褐，较短小，短于胫节直径，基部小黑点斑不明显。跗节细长，污黑褐色。

雄虫体下几全黑，雌虫腹部侧面具污黄褐色纵带。

量度（mm）：体长7.5~9.5，体宽2.3~2.90。头长0.70，头宽1.28，头顶宽0.54。触角各节长1.50:3.40:1.30:1.58。前胸背板长1.48，后缘宽2.50。革片长4.40，楔片长1.66。

观察标本：3♂♂，辽宁营口，1990，李景科采；4♀♀，Mahochan，1918.VII.12~18；2♂♂2♀♀，吉林小岭，1940.VI.30；1♀，黑龙江扎兰屯，1938.VI；1♂，河北平泉光头山，1400m，1995.VI.28，卜文俊采；1♀，陕西周至厚畛子，1500~2000m，1999.VI.21，刘缠民采。

分布：河北、辽宁、吉林、黑龙江、陕西；朝鲜，日本，俄罗斯（远东）。

48. 水杉盲蝽属 *Metasequoiamiris* Schwartz, 1995

Metasequoiamiris Schwartz, 1995: 401. Type species: *Metasequoiamiris carvalhoi* Schwartz, 1995; by mono-