

环。后足胫节基半具3个较隐约的褐环。

量度 (mm): 体长5.2, 体宽1.7~1.75。头长0.38, 头宽1.0, 头顶宽0.25。触角各节长0.83:1.75:1.2:0.52。前胸背板长1.1, 后缘宽1.50。革片长2.33, 楔片长0.6。

模式标本: 正模♂, 海南吊罗山新安林场, 1980. IV. 1, 邹环光采 (存NKU) (已检查)。

观察标本: 1♂(正模), 海南吊罗山新安林场, 1980. IV. 1, 邹环光采; 1♀, 同前; 2♂♂, 同前, 任树芝采; 4♀♀, 海南尖峰岭, 1980. IV. 11, 邹环光采。

分布: 海南。

(348) 台湾猬盲蝽 *Tinginotum formosanum* Poppius, 1915

Tinginotum formosanum Poppius, 1915a: 22; Carvalho, 1959: 267; Miyamoto & Lee, 1966: 387; Carvalho, 1980: 657; Schuh, 1995: 964; Yasunaga, 1999: 40; Kerzhner & Josifov, 1999: 181.

椭圆形, 无光泽。灰褐或污褐色。

头灰黄褐色, 具隐约的灰白色斑, 头顶两侧及后缘处的斑较明显; 毛多淡色, 褐色的直立毛较少。头顶后缘有一隐约的褐色短中纵纹, 后延纵贯领。触角第Ⅰ节相对细长, 中段略细, 淡黄白色, 亚基部有斜伸的黑纹, 或成倒“V”字形, 端半内侧黑, 末端淡色, 毛短小, 半直立, 明显短于该节直径; 第Ⅱ节雌线形, 雄向端轻度加粗, 毛短密平伏, 无明显直立毛; 此节黑褐色, 最基部及末端白色, 亚基部及中部各有一短白环; 第Ⅲ节黑, 中央及末端狭窄地黄白色; 第Ⅳ节黑。喙伸达中足基节前部。

前胸背板盘域中部明显拱隆, 近后侧角区域处下降, 与后侧角间成一宽缓界限; 后缘宽弧形; 前胸背板淡污褐色, 盘域隐约具3条因粉被而呈灰色的宽纵带, 或因全面具粉被而呈灰褐色; 脾区内半亦呈灰色; 后缘狭窄地白色, 后侧角处常为深褐或黑褐色; 直立毛较密, 长而蓬松, 多淡色, 部分黑褐色而成撮状, 于盘域中部显著; 刻点均匀, 较密, 无粉被而呈褐色。

小盾片中部纵向渐隆起, 具明显刻点, 中部常有横皱, 大部黑褐色而具粉被, 中线处的纵带或端部的菱形斑黄白色。爪片及革片底色淡褐或褐色, 具不整齐的淡白色点斑, 斑的情况变异很大, 斑驳状, 革片后半白斑常较少, 斑上密被淡色平伏丝状毛; 直立毛长而较密, 淡褐色, 尚有极少的黑色直立毛。楔片灰白, 近半透明, 端角及中央有一褐色横带, 带的中段有时不显, 基内角处有时有一无粉被的深褐色斑。膜片污灰褐色, 斑驳, 大室外缘脉的两侧色较深; 大室端角约成直角。

体下及足淡灰黄, 腹下两侧可能有两条红色纵纹。前、中足股节近中央有一较窄的褐环, 亚端部2褐环较宽; 前、中足胫节具4个宽褐环, 分布较均匀; 后足股节端部2/3有断续的褐色碎斑, 亚基部约成一或两个宽环状; 后胫亚基部及基部1/4处各有一

窄环。

左阳基侧突体横宽，感觉叶伸出，钝，杆部弯曲。阳茎端无骨化附器，有5个膜叶，最大的膜叶上有一些微刺。

量度 (mm): 体长4.0，体宽1.64。头长0.4，头宽0.88，头顶宽0.25。触角各节长0.5:1.38:0.75:0.65~0.7。前胸背板长1.0，后缘宽1.4。革片长1.8，楔片长1.13。

模式标本：选模♂，台湾 (Mt. Hoozan (= Fengshan)) (存 HNHM) (未检查)。

观察标本：2♂♂7♀♀，贵州赤水桫椤保护区，200~600m，2000.IX.27，李传仁采；1♀，贵州习水长嵌沟，2000.IX.25~28，李子忠采。5♂♂5♀♀，云南景洪，1979. X. 9，刘国卿采；1♂，云南西双版纳曼卢，1958. VI. 6 (IZAS)；2♀♀，云南景洪曼兵，1958. IV. 12 (IZAS)；1♀，广东连县瑶安，1962. X. 25，郑乐怡、程汉华采；1♂1♀，广西龙州大青山，1964. VII. 18，刘胜利采 (TMNH)；6♂♂5♀♀，海南乐东，1964. IV. 9，刘胜利采 (TMNH)。

分布：广东、广西、海南、云南、台湾。

(349) 带胸猬盲蝽 *Tinginotum perlatum* Linnauori, 1961 (图版VII-16)

Tinginotum perlatum Linnauori, 1961: 155; Schuh, 1995: 965; Yasunaga, 1999: 44; Kerzhner & Josifov, 1999: 181; Zheng & Lu, 2002: 505.

体长椭圆形，相对较狭，无光泽；灰白色与褐或浅黑褐色相间，斑驳。

头横列，淡褐至褐色，具灰白色粉被，常有一褐色中纵纹贯全长，额区有4~5对平行横棱，头顶两侧各有一半月形斑（在粉被完全脱落的标本中，头全部为褐色）；毛较短密，半平伏，淡色；眼大，雄头顶宽仅为眼宽之0.23倍；唇基常整个黑色，有光泽；头顶中纵沟明显，后缘嵴低宽。触角污黄褐，第Ⅰ节两端加深，第Ⅱ节端半渐深，中段无淡色环；第Ⅲ、Ⅳ节黑褐。喙伸达后足基节末端。

前胸背板拱隆饱满，前倾，毛较长，直立或半直立，黄褐或褐色；刻点不显著，或较为明显，或呈点皱状不等；前胸背板底色灰白，或仅中纵宽带灰白，其余部分具斑驳的褐色或黑褐色碎斑，中线两侧各有一条微向内弯的褐色或黑褐色纵带，前伸过胚，达前胸背板前侧角，后端延入小盾片基半，渐淡，黑褐带中段上的毛可为黑褐色，其余毛淡色。

小盾片灰白，基半全褐或具两条深色宽带；直立毛长，与爪片毛的长度相近。半鞘翅斑驳，爪片刚毛状毛半直立，革片上的此类毛半平伏，淡斑上的毛多为平伏丝状毛，较短密；缘片端半的深色部分的楔片内缘常呈红色；楔片内角区域亦常为红色。膜片烟褐，斑驳，深色斑淡黑褐色。

腹下及足淡色，前、中足股节亚端部有2褐环，后足股节端部2/3黑褐或有2个淡