

窄环。

左阳基侧突体横宽，感觉叶伸出，钝，杆部弯曲。阳茎端无骨化附器，有5个膜叶，最大的膜叶上有一些微刺。

量度 (mm): 体长 4.0, 体宽 1.64。头长 0.4, 头宽 0.88, 头顶宽 0.25。触角各节长 0.5:1.38:0.75:0.65~0.7。前胸背板长 1.0, 后缘宽 1.4。革片长 1.8, 楔片长 1.13。

模式标本: 选模♀, 台湾 (Mt. Hoozan (= Fengshan)) (存 HNHM) (未检查)。

观察标本: 2♂♂7♀♀, 贵州赤水桫椤保护区, 200~600m, 2000.IX.27, 李传仁采; 1♀, 贵州习水长嵌沟, 2000.IX.25~28, 李子忠采。5♂♂5♀♀, 云南景洪, 1979.X.9, 刘国卿采; 1♂, 云南西双版纳曼卢, 1958.VI.6 (IZAS); 2♀♀, 云南景洪曼兵, 1958.IV.12 (IZAS); 1♀, 广东连县瑶安, 1962.X.25, 郑乐怡、程汉华采; 1♂1♀, 广西龙州大青山, 1964.VII.18, 刘胜利采 (TMNH); 6♂♂5♀♀, 海南乐东, 1964.IV.9, 刘胜利采 (TMNH)。

分布: 广东、广西、海南、云南、台湾。

(349) 带胸狷盲蝽 *Tinginotum perlatum* Linnavuori, 1961 (图版 VII-16)

Tinginotum perlatum Linnavuori, 1961: 155; Schuh, 1995: 965; Yasunaga, 1999: 44; Kerzhner & Josifov, 1999: 181; Zheng & Lu, 2002: 505.

体长椭圆形, 相对较狭, 无光泽; 灰白色与褐或浅黑褐色相间, 斑驳。

头横列, 淡褐至褐色, 具灰白色粉被, 常有一褐色中纵纹贯全长, 额区有 4~5 对平行横棱, 头顶两侧各有一半月形斑 (在粉被完全脱落的标本中, 头全部为褐色); 毛较短密, 半平伏, 淡色; 眼大, 雄头顶宽仅为眼宽之 0.23 倍; 唇基常整个黑色, 有光泽; 头顶中纵沟明显, 后缘嵴低宽。触角污黄褐, 第 I 节两端加深, 第 II 节端半渐深, 中段无淡色环; 第 III、IV 节黑褐。喙伸达后足基节末端。

前胸背板拱隆饱满, 前倾, 毛较长, 直立或半直立, 黄褐或褐色; 刻点不显著, 或较为明显, 或呈点皱状不等; 前胸背板底色灰白, 或仅中纵宽带灰白, 其余部分具斑驳的褐色或黑褐色碎斑, 中线两侧各有一条微向内弯的褐色或黑褐色纵带, 前伸过胝, 达前胸背板前侧角, 后端延入小盾片基半, 渐淡, 黑褐带中段上的毛可为黑褐色, 其余毛淡色。

小盾片灰白, 基半全褐或具两条深色宽带; 直立毛长, 与爪片毛的长度相近。半鞘翅斑驳, 爪片刚毛状毛半直立, 革片上的此类毛半平伏, 淡斑上的毛多为平伏丝状毛, 较短密; 缘片端半的深色部分的楔片内缘常呈红色; 楔片内角区域亦常为红色。膜片烟褐, 斑驳, 深色斑淡黑褐色。

腹下及足淡色, 前、中足股节亚端部有 2 褐环, 后足股节端部 2/3 黑褐或有 2 个淡

色环；胫节淡色，深色个体前、中足胫节可见3~4个深色环。后足胫刺黑褐，基部有极小的黑色点斑。

量度 (mm)：体长4.75~5.50，体宽1.68~1.83。头长0.28，头宽1.0~1.1，头顶宽0.25 (♂)，0.30 (♀)。触角各节长0.60:1.50:0.90:0.73。前胸背板长0.78，宽1.43，领宽0.63。革片长2.35，楔片长0.70。

观察标本：1♀，云南金平，1990. II . 7，徐志强采；1♂，台湾桃园大关山森林，1990. IV . 17，C. C. Chiang 采 (NMNS)；2♀♀，台湾南投水里，1990. VII . 31，C. M. Lin 采 (NMNS)；3♀♀，同前，C. C. Chiang 采 (NMNS)；1♂1♀，台湾新竹关雾 (1980m)，1989. IV . 25~29，C. S. Lin 采，灯诱 (NMNS)；1♀，台湾南投雾社 (1000m)，1989. XI . 7~8，C. S. Lin 采，灯诱 (NMNS)；1♀，台湾阿里山，2130m，1947. VIII . 23，J. L. Gressitt 采 (BIM)。

分布：云南、台湾；日本。

(350) 松猫盲蝽 *Tinginotum pini* Kulik, 1965

Tinginotum pini Kulik, 1965b: 1503; Kerzhner, 1988a: 799; Schuh, 1995: 965; Yasunaga, 1999: 43; Kerzhner & Josifov, 1999: 181.

Tinginotum distinctum Miyamoto et Lee, 1966: 386. Synonymized by Kerzhner, 1972: 283.

体长椭圆形，体色深浅变异较大，无光泽。

头垂直。底色黄白或灰黄，淡色个体仅下颚片下半灰黑色；多数个体额-头顶区灰黑，被浓密粉被，可见平行横棱；头部毛直立，粗长而较密，头顶中央毛黑色，其余白色。头顶常有一对斜置光滑横斑；头顶后缘处有一宽而低平的嵴，与头顶之间有一浅凹痕分开，后缘较锐。触角第I节底色黑，两侧具几贯全长的白纹，淡色个体外侧只基部2/3具白纹，且常不甚完整，深色个体中此节可几全黑；第II节黑，基部及中央狭窄地黄白色；第III节黑，中央有一小白环；第IV节全黑。喙黑褐，粗壮，伸达后足基节后缘或略过之（浙江庆元标本仅伸达中足基节）。

前胸背板深灰褐至灰黑，具粉被，领同；盘域在淡色个体中可辨4条宽褐纵带与5条灰白粉被带相间，褐纵带后端处与中段常加深成深褐斑状；直立毛较粗强，长而密，多为黑色至全部黑色或只褐纵带上的毛为黑色，其余淡色，或上述深褐斑上的毛更密而成黑毛撮状；刻点较深大。背板前倾程度相对较小，盘域在胛后较平缓地拱隆，后侧角区离角端不远处在后缘前略下凹，后缘中段平直。小盾片较平，灰褐或灰黑褐，一色，或中央具灰白纵带，或端部灰白，或基角变为淡色；直立毛长，中部黑毛多。半鞘翅底色橙褐、栗褐至黑褐色，淡色斑白至深灰色，革片淡色斑集中于中段成横带状，此带状区域长短不一，可成一横纹状；直立毛淡色。楔片可全为深栗褐至黑褐色，其上的淡斑亦有白色的丝状短密毛。膜片深栗褐或黑褐；大室端缘白色。