

0.36；头顶中纵沟浅，后缘嵴完整；唇基端部2/5或全部黑褐色至黑色。触角第Ⅰ节黄褐，第Ⅱ节基部浅褐，其余部分均为黑色。喙伸达后足基节。

雄虫前胸背板黑色，胝区及胝前区域黄褐色，后侧角及最后缘黄白色；雌虫则为黄褐色，仅中部后缘有一黑褐至黑色的横带，有时此横带可伸至两侧缘，并前弯至前胸背板前缘。小盾片黑色，具横皱。半鞘翅黄褐色；爪片黑褐至黑色，仅基部外缘黄褐；革片端部内角有一褐色长形大斑；楔片有时内缘色略深，雄虫楔片长约为基部宽的2倍，雌虫约为1.6倍。膜片烟褐色。雄虫体下深色，前胸侧板除端部黄白外均为黑色，胸下黑褐色，臭腺沟缘及臭腺蒸发域黄白色，腹部腹板浅黄褐色，沿气门有一黑褐色纵带直达腹末，整个生殖节黑褐色；雌虫前胸侧板与胸部腹板黄褐色，或同雄虫；腹下浅黄褐色。足黄褐，有时股节亚端部隐约可见2褐色环；胫节刺黄褐，刺基的小点斑略深；第Ⅲ跗分节端半部褐色。

左阳基侧突感觉叶无明显的突起。右阳基侧突体部直长，端突直，极短小，末端平截。阳茎端针突轻度弯曲，末端尖；叶状骨片长形；锉叶细长，全长具刺；中骨片及箍骨片缺失；最右端膜叶长形，表面密布微刺；导精管膨大，近长筒形，次生生殖孔较小。




图 143 黑盾新丽盲蝽，新种 *Neolygus nigroscutellaris* Lu et Zheng sp. nov.

a. 阳茎端 (vesica); b. 锉叶 (rasp); c. 左阳基侧突 (left paramere);
d~e. 右阳基侧突 (right paramere)。

量度 (mm): 体长3.71~4.13，体宽1.41~1.56。头长0.20~0.22，头宽0.94~0.95，头顶宽(♂)0.23，(♀)0.34。触角各节长0.44~0.46:1.59~1.66:0.71~0.74:0.44~0.46。前胸背板长0.58~0.75，后缘宽1.33~1.46。革片长1.84~2.07，楔片长0.52~0.55。

种名词源：①拉丁文字根 *nigr-*，意为黑色；②拉丁文字根 *scutellar-*，意为小盾片。

指新种的小盾片为黑色。

模式标本：正模♂，云南西双版纳勐海，1200~1600m，1958.VII.19，王书永采（存IZAS）。副模：1♀，同正模；1♀，1958.VII.18，其他同正模；1♂，台湾木栅，1963.III.5，马骏超采（BIM）；1♂，台湾雾社，660m，1962.I.31，C.M.Yoshimoto leg.（BIM）；1♀，台湾雾社，960m，1962.I.19~20，C.M.Yoshimoto leg.（存BIM）；1♀，台湾南投Hweishun，1990.II.20，C.S.Tseng采，灯诱（NMNS）。

分布：云南、台湾。

本种的鉴别特征包括：较小的体型、黑色的小盾片、前翅以及前胸背板上的色斑等。

(236) 花斑新丽盲蝽，新种 *Neolygus pictus* Lu et Zheng sp. nov. (图 144)

体长椭圆形，略狭长。黄褐色；毛黄褐色。

头黄褐，具光泽，毛稀疏；头顶极窄，雄虫头顶宽约为头宽的0.22倍，雌虫为0.32倍；头顶中纵沟及后缘嵴明显；唇基端部褐至黑褐色。触角第Ⅰ节黄褐，第Ⅱ节除基部1/5褐色及端部1/3深褐色外，均为黄褐色，第Ⅲ、Ⅳ节除第Ⅲ节最基部黄白色外，均为深褐色。喙黄褐色，仅末节端部黑褐，第Ⅰ节两侧通常各有一条极细的红色纵线；伸达后足基节末端。

前胸背板黄褐色，胝色略深，刻点细小，毛半直立。小盾片黄褐，有时中央浅褐色，具横皱。半鞘翅黄褐色；爪片内侧加深为褐色；革片端部内角有一浅褐色横斑，由端部内角伸至缘片，另有一断续的褐色斜斑从基内角发出，与爪片平行；楔片长约为基部宽的1.7倍。膜片烟褐色；翅室内端部褐色，其余部分无色半透明。体下黄褐，略带红色；腹下侧缘有一红色纵带，约占腹板宽的2/5，该带内缘通常红褐色。足黄褐色，股节亚端部具2褐色环，前、中足的色浅，有时消失，后足的环为深褐至红褐色；后足股节端部1/2~2/3红至红褐色。胫节刺黄褐，刺基具一浅褐色斑；第Ⅲ跗分节末端深褐色。

左阳基侧突体部直，感觉叶端部具明显的突起，其上尚有一小突起。右阳基侧突体部小，感觉叶无突起，端突较直，近端部弯曲。阳茎端针突长，基部扭曲；叶状骨片狭长，与针突近等长；锉叶直，极长，端部略膨大，无刺；中骨片及箍骨片无；最右端膜叶长筒形，基部表面密布微刺；导精管筒形，次生生殖孔宽大。

量度 (mm)：体长4.41~4.97，体宽1.56~1.67。头长0.22~0.32，头宽1.06~1.08，头顶宽(♂)0.23，(♀)0.35。触角各节长0.61~0.65:1.94~2.04:1.43~1.60:0.51~0.61。前胸背板长0.72~0.75，后缘宽1.46~1.53。革片长2.21~2.25，楔片长0.65~0.75。

新种词源：拉丁文字根pict-，意为“有花斑的”、“着色的”，指新种色斑明显。