



图 167 黄褐奥盲蝽 *Orthops (Orthops) ferrugineus* (Reuter)

a. 左阳基侧突 (left paramere); b. 右阳基侧突 (right paramere); c. 阳茎端 (vesica)。

中国其他记录：甘肃南部 (Schwartz & Kerzhner, 1996)。

分布：湖北、四川、甘肃、西藏。

虫体远较属内其他已知种长大，雌雄异型明显，加之头部特征和前翅革质部儿一色，可与属内其他种相区别。

(262) 东亚奥盲蝽 *Orthops (Orthops) udonis* (Matsumura, 1917) (图 168, 图版 VI-6)

*Lygus flavoscutellatus* Matsumura, 1911b: 37. Preoccupied.

*Lygus udonis* Matsumura, 1917: 434.

*Orthops (Orthops) udonis* (Matsumura): Kerzhner & Josifov, 1999: 134; Zheng & Lu, 2002: 499.

*Lygus sachalinus* Carvalho, 1959: 138. New name for *Lygus flavoscutellatus* Matsumura 1911. Synonymized by

Yasunaga Miyamoto & Kerzhner, 1996: 93.

*Orthops sachalinus* (Carvalho): Kerzhner, 1978: 40; Kerzhner, 1988: 812; Zheng, 1995: 465; Schuh, 1995: 858.

体长卵形；体色及斑纹变异较大；被金黄色柔毛，略具光泽。

头垂直，黄褐色，具稀疏毛；雄虫头顶宽为头宽的 0.42~0.46 倍，雌虫为 0.47~0.49 倍；唇基深褐至黑色；头顶中纵沟明显，常有一形状不等的黑褐斑；后缘嵴完整；上颚片及下颚片多为黄白色，有时颊及小颊褐至黑褐色。触角深褐色，有时第 I 节黄褐