



图 168 东亚奥盲蝽 *Orthops (Orthops) udonis* (Matsumura)

a. 左阳基侧突 (left paramere); b. 右阳基侧突 (right paramere); c. 阴茎端 (vesica)。

汉华采; 1 ♀, 贵州雷公山, 1983. VII. 13, 邹环光采; 3 ♂♂, 云南龙陵, 1000m, 1955. V. 20, B. 波波夫采; 1 ♂, 陕西旬阳, 1985. V. 15, 贺达汉采; 1 ♀, 陕西石泉, 1980. V. 25, 向龙成、马宁采; 1 ♀, 陕西略阳, 1984. VII. 4, 唐周怀采; 11 ♂♂ 6 ♀♀, 新疆哈巴河铁烈克提, 1975. VIII. 14; 2 ♀♀, 新疆塔城, 470m, 1960. IX. 10, 王书永采。

分布: 河北、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、江苏、河南、湖北、广西、四川、贵州、云南、陕西、新疆; 俄罗斯, 日本, 朝鲜半岛。

(263) 纹头奥盲蝽 *Orthops (Orthops) vitticeps* (Reuter, 1906) (图 169)

*Lygus kalmi* var. *vitticeps* Reuter, 1906a: 46.

*Orthops kalmi* var. *vitticeps* (Reuter): Carvalho, 1959: 179.

*Orthops kalmi vitticeps* Reuter: Schuh, 1995: 856.

*Orthops vitticeps* (Reuter): Schwartz et Kerzhner, 1997: 253 (upgraded to specific rank).

*Orthops (Orthops) vitticeps* (Reuter): Kerzhner & Josifov, 1999: 134; Zheng & Lu, 2002: 500.

体长卵形, 雄明显长于雌; 略具光泽。

头垂直, 深褐色, 头顶两侧黄褐色; 具稀疏毛; 雄虫头顶宽为头宽的 0.35~0.39 倍, 雌虫为 0.4 倍; 头顶中纵沟极浅, 后缘脊完整明显; 上颚片及下颚片有时部分或全