



图 179 扁植盲蝽 *Phytocoris intricatus* Flor, 1861

a~b. 阳茎端 (vesica); c. 雄虫生殖囊 (male genital capsule); d~e. 梳状板 (comb-shaped spiculum); f~g. 右阳基侧突 (right paramere); h. 左阳基侧突 (left paramere); i. 左阳基侧突杆部 (shaft of left paramere); j. 左阳基侧突感觉叶 (sensory lobe of left paramere)。



部扁。左阳基侧突弯曲约呈直角；感觉叶肥大，中度突出，其内侧具齿；杆部背腹压扁，约在基部1/3处最窄；端突侧扁。阳茎端基部右侧具1小骨片，梳状板附近具1带状骨片伸展到次生生殖孔基方；主膜叶腹面可见2叶，梳状板附于主膜叶上，位于次生生殖孔上方，具2排齿，左侧端半与基半齿相向排列，端半齿较大，基半齿较小，约在中部相遇，左侧具指向基方齿的部分比右侧长。

量度 (mm)：体长 6.0~7.2，体宽 2.5。头长 0.40，头宽 0.99~1.13。头顶宽 (♂) 0.24~0.28，(♀) 0.41~0.42。触角各节长 (♂) 1.26~1.40:2.94~3.61:1.57~1.83:1.18~1.40，(♀) 1.41~1.61:3.02~3.26:1.61~1.78:1.33。前胸背板长 0.88，后缘宽 1.53~1.86。革片长 3.50，楔片长 1.25。

观察标本：5♂♂4♀♀，宁夏六盘山二龙河，1987.VIII.6~7，郑乐怡采，采自 *Sorbaria* sp., *Cotoneaster* sp., *Salix* sp., *Rosa omeiensis* var. *pteracantha*；2♂♂，宁夏六盘山老龙潭。1987.VIII.6，郑乐怡采，采自 *Sorbaria* sp.；9♂♂9♀♀，甘肃榆中兴隆山，2200~2300m，1993.VII.29~VIII.1，吕楠、卜文俊采；3♂♂2♀♀，甘肃榆中麻家寺，2200~2260m，1993.VIII.4，吕楠、卜文俊采，3♂♂3♀♀，黑龙江伊春五营，1980.VII.18~19，郑乐怡、汪兴鉴采；1♂4♀♀，黑龙江帽儿山，1988.VIII.17，李新正采，采自 *Pinus* sp.；2♀♀，河北雾灵山，1973.VIII.21；1♀，河北围场，1984.IX.9，郑乐怡采。

中国其他记录：内蒙古兴安盟和阿拉善盟（能乃扎布、照日格图，1992）。

分布：河北、内蒙古、黑龙江、四川、甘肃、宁夏；朝鲜，欧洲，俄罗斯。

### (280) 依植盲蝽 *Phytocoris issykensis* Poppius, 1912 (图 180)

*Phytocoris issykensis* Poppius, 1912a: 3; Carvalho, 1959: 303; Nonnaizab & Jorigtoo, 1992: 314; Schuh, 1995: 885; Vinokurov & Kanyukova, 1995b: 98; Kerzhner & Josifov, 1999: 155.

雄虫长椭圆形；雌虫长翅型或短翅型，长翅型个体长椭圆形，短翅型个体长卵形。浅黄色，有时稍带蓝色，具深色斑纹。

头淡黄色，有时稍带蓝色，具橘黄色斑，头背面橘黄斑在纵中线两侧几呈条纹状。触角第I节粗，圆筒形，淡黄，有时略带蓝色，具浅褐或褐色斑，密布直立与近平伏的毛，直立毛稍短于该节直径；第II~IV节细长，线形，单一淡黄色至褐色。喙明显伸过后足基节。

前胸背板淡黄色，有时略带蓝色；或为黄色，略呈橘色；有时亚后缘灰褐或灰黄色；前胸背板被银白色丝状毛及黑褐色半直立毛，领及胫区直立或半直立毛浅色。小盾片单一淡黄色，密布银白色丝状毛，黑褐半直立毛稀少。半鞘翅黄白或淡黄色，密布银白色丝状毛及黑褐色半直立毛，浅色半直立毛较少；爪片脉两侧具灰黄或灰褐色较宽的纵斑；革片端部具1菱形污白斑，该处着生的毛均为银白色，其前缘具1灰褐斜纹，纹