

图 182 斑胸植盲蝽 *Phytocoris knighti* Hsiao

a~b. 梳状板(comb-shaped spiculum); c~d. 右阳基侧突(right paramere); e. 左阳基侧突(left paramere); f. 左阳基侧突杆部(shaft of left paramere); g. 左阳基侧突感觉叶(sensory lobe of left paramere); h~j. 阴茎端(vesica)。

头顶宽/眼宽 = (♂) 0.52~0.80, (♀) 1.25~1.26; 触角第 II 节长/触角第 I 节长 = 1.88~2.12, 头宽/前胸背板宽 = 0.52~0.67; 触角第 I 节长/头宽 = 1.28~1.47, 触角第 I 节长/前胸背板宽 = 0.74~0.86; 体长/前胸背板宽 = (♂) 4.1~4.2, (♀) 3.5~3.7。

雄虫生殖囊开口边缘无突起。右阳基侧突小, 中度侧扁, 近基处最宽, 背侧具少许齿, 端部背腹压扁。左阳基侧突弯曲, 具少许齿; 感觉叶高度突起; 杆部长, 轻度扁




图 183 植盲蝽属前翅色斑 (Forewing of *Phytocoris* spp.)

- a. 斑胸植盲蝽 (*Ph. knighti* Hsiao); b. 卧龙植盲蝽 (*Ph. wolongensis* Xu et Zheng); c. 永平植盲蝽 (*Ph. yongpingensis* Xu et Zheng); d. 武定植盲蝽 (*Ph. wudingensis* Xu et Zheng); e. 角斑植盲蝽 (*Ph. exohataensis* Xu et Zheng)。

平，端部膨大呈背腹压扁；端突钝，侧扁。阳茎端（未膨胀）：梳状板位于次生生殖孔端方，齿向顺时针，左侧齿稀，基部齿小而密。

量度 (mm)：体长 7.3~8.6，体宽 2.40。头长 0.50，头宽 1.09~1.20，头顶宽 (♂) 0.25~0.32，(♀) 0.44~0.45。触角各节长 1.53~1.64:3.09~3.31:1.55~1.63:1.13~1.20。前胸背板长 0.90，后缘宽 1.78~2.23。革片长 3.88，楔片长 1.50。

模式标本：正模 ♂，四川峨眉山，11000ft，1934.VIII，D. C. Graham 采（存 US-NM）（未检查）。

观察标本：1 ♂ 1 ♀，云南哀牢山徐家坝，1984.V.4，郑乐怡采（灯诱）；1 ♀，云南哀牢山徐家坝，1982；2 ♂ ♂，云南玉龙山，4200m，1979.VII.16。

分布：四川、云南。