

(304) 黄色植盲蝽 *Phytocoris stoliczkanus* Distant, 1879 (图 202)*Phytocoris stoliczkanus* Distant 1879: 124; 1904: 449; Carvalho 1959: 217; Schuh 1995: 908.图 202 黄色植盲蝽 *Phytocoris stoliczkanus* Distant

a~b. 雄虫生殖囊 (male genital capsule); c~d. 右阳基侧突 (right paramere); e. 左阳基侧突 (left paramere);
 f. 左阳基侧突感觉叶 (sensory lobe of left paramere); g. 梳状板 (comb-like spiculum); h~i. 阳茎端 (vesica)。

体长椭圆形，略宽，单一污黄色。背面密布黑色半直立毛与银白色丝状毛。

头部无黑色毛，下方淡黄色，具少数黄色略带橙色的斑。触角第Ⅰ节黄褐，具淡黄斑，被有平伏短毛以及少许直立浅色毛；第Ⅱ节黄褐，基部色略浅；第Ⅲ节深黄褐；第Ⅳ节深褐。喙伸达后足基节端。

前胸背板后缘几直。膜片黄白，密布灰褐色乱点。前胸侧板黄白，上缘及中央有时具橘黄纵条纹。足淡黄，股节具橘黄，黄褐或灰褐斑；胫节略带黄褐色，无环纹，被银白半直立毛。雄腹末约达楔片基部1/3处，雌腹末约达楔片端。

雄生殖囊开口两侧基部具突起，右侧突起小。右阳基侧突细长，弯曲，端部细小。左阳基侧端弯曲；感觉叶轻度突起；杆部长，仅端半中度背腹压扁，近端处最宽；端突侧扁。阳茎端肥大，腹面有一高度骨化的带状骨片；梳状板全长附于膜囊之上，形状略呈倒“V”形，左侧齿强壮，基部齿长，右侧齿小，数多于25。

量度(mm)：体长(♂)7.1，(♀)6.3，体宽(♂)2.5，(♀)2.33。头长(♂)0.75，(♀)0.88；头宽(♂)1.06，(♀)0.98；头顶宽(♂)0.46，(♀)0.48。触角各节长(♂)1.40:3.23:1.71:1.11，(♀)1.37:2.80:1.64:1.33。前胸背板长0.96，后缘宽(♂)1.96，(♀)1.71。革片长3.85，楔片长1.0。

观察标本：1♀，四川金川城关，2000~2300m，1966.Ⅸ.7，邹环光采；1♂，西藏吉隆小吉隆，2800m，1975.Ⅶ.22，黄复生采。

分布：四川、西藏；印度，巴基斯坦。

Schuh (1995) 目录上的此种中国产地“Kashgar”恐为误记。

(305) 卧龙植盲蝽 *Phytocoris wolongensis* Xu et Zheng, 2001 (图 183 b; 图 203 b~i)

Phytocoris wolongensis Xu et Zheng, 2001: 257.

体长椭圆形。

头黄白，被浅色毛，头顶无斑；雄虫额具不明显的黄褐放射状斜纹，雌虫无；额端部黑褐；唇基、上颚片、下颚片及小颊具浅褐或黑褐斑。触角暗褐，线形；第Ⅰ节被银白色直立毛与平伏短毛，背面具黄白斑，腹面浅色；第Ⅱ节基部与中部、第Ⅲ节基部、中部与端部具白色或黄白色环。喙伸过后足基节。

前胸背板灰黄色，两侧黑褐，后缘黄白色，其前具黑褐斑块，胫区后面具2黑褐小斑；领及胫区黄白色，具少许浅褐斑；前胸背板密布深褐或黑褐短毛，银白色丝状毛稀少。小盾片隆起，灰黄色，浅色纵中线清晰，近端部两侧具褐斑。半鞘翅黄白色，被平伏浅色丝状毛及半直立毛，半直立毛与着生处同色；爪片中部、革片基部与内侧、楔片端、以及缘片具黑褐斑；革片亚端部具著的四方形黑褐色大斑，暗褐色，仅下缘浅色。足基节黄白，具少许褐斑；股节黄白色，具黑褐斑；前足胫节基部及端部黑褐，并具2黑褐环；中足胫节基节黑褐，端部黄白，并具3个黑褐色环，中间深色环在雄虫中宽于