

头垂直，深褐色，具稀疏毛；额区同体色，饱满，具6对相互平行的浅横棱；雄虫头顶与头的宽度比为0.33，雌虫为0.39，头顶中纵沟较浅，后缘嵴完整且多为红色，雌虫沿中纵沟至唇基端部色略深。触角第Ⅰ、Ⅱ节浅黄褐色，第Ⅲ、Ⅳ节浅褐色。喙伸达后足基节。

领白至黄白色；前胸背板同体色，后缘有一极窄的白色边；刻点密且深，分布均匀；略具光泽；胝略隆起，雄虫胝区黑色，雌虫的胝区及亚后缘的一横带深红褐色。小盾片同体色，端角白至黄白色；具横皱。半鞘翅同体色；雄虫楔片褐色，略带红色，雌虫则为红色；楔片长为基部宽的1.7倍。膜片烟黑色；翅脉锈红色。臭腺沟缘与蒸发域黄白色。雄虫胸下黑褐色，腹下黄白色，侧缘具一黑褐色纵带，约占腹板一侧宽的1/3，整个生殖节深褐色；雌虫胸下深红褐色，腹下黄褐，侧缘具一红色宽纵带，约占腹板宽的1/2，末节腹面鲜红色。足黄褐，股节密布红色碎斑，前、中足红斑较少或无，后足股节则几乎全部为红色；胫节刺浅褐；第Ⅲ跗分节末端黑褐。

左阳基侧突感觉叶基部明显膨大，端突末端尖，亚端部具一倒钩；右阳基侧突感觉叶不发达；端突较宽短，斜指，末端平截。阳茎端：针突较长，末端圆钝，为一扁平的片状；具刺膜叶宽大；叶状骨片中部弯曲，末端尖；中骨片发达为半透明的长形；具刺膜叶细长筒形；另有一膜叶表面无刺，导精管细长，次生生殖孔较小。

量度 (mm)：体长4.41~5.60，体宽1.55~2.11。头长0.30~0.41，头宽0.98~1.09，头顶宽(♂)0.31，(♀)0.41。触角各节长度0.55~0.60:2.16~2.23:1.04~1.15:0.62~0.69。前胸背板长0.75~0.94，后缘宽1.36~1.67。革片长2.28~2.72，楔片长0.67~0.79。

观察标本：7♂♂21♀♀，黑龙江帽儿山，1988. VII. 17，李鸿阳采；1♂，黑龙江伊春五营，1980. VII. 22，汪兴鉴采；1♂，云南景东哀牢山徐家坝，2350m，1988. VIII. 19，灯诱，郑乐怡采。

分布：黑龙江、云南；俄罗斯（远东地区），日本。

### (313) 红褐松盲蝽 *Pinalitus rubeolus* (Kulik, 1965) (图 208 a~c)

*Orthops rubeolus* Kulik, 1965c: 149.

*Lygus (Orthops) rubeolus* Kulik, 1977: 28.

*Pinalitus rubeolus* (Kulik): Kerzhner, 1988b: 70; Kerzhner, 1988a: 813; Schuh, 1995: 918; Kerzhner & Josifov, 1999: 167; Lu & Zheng, 2002: 5.

雄虫体长形，两侧平行，雌虫长卵形。红至红褐色；密被金黄色毛，毛较短。

头垂直，红或红褐色，具稀疏毛；额区饱满，具6对相互平行的横棱；头顶两侧略凹陷，黄褐色，雄虫头顶与头的宽度比为0.26，雌虫为0.35~0.41，头顶中纵沟浅，后缘嵴完整；唇基红褐至黑色，下颚片红褐色，小颊深褐色。触角第Ⅰ、Ⅱ节黄褐色，