



图 208 (a~c) 红褐松盲蝽 *Pinalitus rubeolus* Kulik;

(d~f) 黑头松盲蝽 *Pinalitus nigriceps* Kerzhner

a, d. 阳茎端, 左面观 (vesica, right view); b, e. 右阳基侧突, 内面观 (right paramere, inner view);
c, f. 左阳基侧突, 外面观 (left paramere, outer view)。

第Ⅲ、Ⅳ节浅褐或深褐色。喙伸达后足基节。

领黄白色; 前胸背板红至深红褐色, 后缘有一极窄的黄白色边, 雄虫胝及胝前区域深褐色; 刻点密且深, 分布均匀, 无横皱; 略具光泽。小盾片浅红至红褐色, 端角浅黄褐色; 具横皱。半鞘翅同体色; 爪片有时为黄褐色, 沿爪片接合缝有时色略浅; 楔片长约为基部宽的 1.6~1.7 倍。膜片淡烟褐至烟褐色; 翅脉红色。

体腹面臭腺沟缘与蒸发域黄白色; 雄虫胸下深褐色, 腹下浅红色, 中央黄褐; 雌虫胸下红褐色, 腹下锈红色, 略带橙色。足基节浅黄褐, 基半部常带褐色; 股节红色, 常具许多黄褐色斑; 胫节黄褐, 基部外侧常带红色, 胫节刺深褐色; 第Ⅲ跗分节端半部深褐。

云南昆明筑竹寺一批标本中有以下色斑类型: 前胸背板盘域前半有一中部细而向两侧加宽的黄带, 侧角处有一黑斑。小盾片底色黄, 中央大体成红褐色“X”形斑。革片内半中段有向内后方斜伸、向后渐狭的狭长三角形斑, 斑隐约, 色较淡而近乎透明。

左阳基侧突感觉叶发达, 端突细长, 末端尖, 亚端部具一倒钩; 右阳基侧突端突宽短, 末端平截。阳茎端针突长, 末端圆钝, 为一扁片状; 具刺膜叶宽大, 末端尖; 叶状