

- 触角第Ⅱ节毛较短，最长者不达该触角节直径 西伯利亚狭盲蝽 *S. (S.) sibirica*
10. 左阳基侧突杆部的大部分几乎等粗 (图 220b) 11
左阳基侧突杆部端半向端渐狭而端尖 (图 221a)。雄虫生殖囊开口在左阳基侧突着生处的内侧的突起长，成长条状 (图 220a)。阳茎端在次生生殖孔左侧有一独立的细指状直长囊 (图 221e, f)。雌虫触角第Ⅱ节淡色细长毛角度明显大于稠密的毛，因而显著
..... 山地狭盲蝽 *S. (S.) alpestris*
11. 左阳基侧突干部亚端部不膨大成鸭头形，端部斜截 (图 221b)。雄虫生殖囊开口在左阳基侧突着生处的内侧的突起短，成短钝的突起状 (图 220b)。阳茎端在次生生殖孔左侧无指状直长囊，膨胀时有一弯曲短囊 (图 221g~h)。雌触角第Ⅱ节淡色细长毛角度与稠密毛相似，因而不显
..... 深色狭盲蝽 *S. (S.) elegans*
- 左阳基侧突干部亚端部膨大成鸭头形 短胸狭盲蝽 *S. (S.) brevinota*
12. 体特大，体长达 11mm。前胸背板长达 1.4mm，桶状，两侧较平行，侧缘直，直至后侧角区域处凹弯 (图 224a)。触角第Ⅰ、Ⅱ节毛显著浓密，略呈毛刷状 毛角狭盲蝽 *S. (S.) antennata*
- 体长在 10mm 以下。前胸背板较短 13
13. 前翅缘片显著加宽，二翅合拢时明显宽于前胸背板后缘。体宽短，体长 6.8mm 左右
..... 扩翅狭盲蝽 *S. (S.) holsata*
- 前翅缘片一般，不显著加宽，二翅合拢时宽约等于前胸背板后缘 14
14. 触角第Ⅱ节短，与前胸背板侧缘以及触角第Ⅰ节约等长 光滑狭盲蝽 *S. (S.) laevigata*
- 触角第Ⅱ节明显长于前胸背板侧缘以及触角第Ⅰ节 15
15. 前胸背板胝及胝前区的深色部分褐或锈褐，不呈黑色。整个前胸背板坡度一致，盘域不突然拱隆。雄生殖囊开口在左阳基侧突着生处外侧具较尖长的突起 16
- 前胸背板胝及胝前区的深色部分黑色或黑褐色。胝及胝前区较平，盘域较突然地拱隆。已知雄性的种类中，雄生殖囊开口在左阳基侧突着生处外侧无突起或极低钝地突出 17
16. 体红色成分明显，前翅膜片脉红色。触角第Ⅰ节细长直立毛不显著
..... 红褐狭盲蝽 *S. (S.) longicollis*
- 体无红色成分，前翅膜片脉污黄褐色。触角第Ⅰ节稀疏细长直立毛显著
..... 长狭盲蝽 *S. (S.) longula*
17. 体短小，体长在 8mm 以下。雌触角第Ⅱ节基段的毛加长的程度甚弱
..... 小狭盲蝽 *S. (S.) parvula*
- 体长在 8mm 以上 18
18. 革片深色区域的外侧向外渐加深，与其外侧的淡色区域之间反差明显；深色区域的后端角向外或多或少伸展。触角第Ⅰ节大角度稀疏细长毛明显 中华狭盲蝽 *S. (S.) chinensis*
- 革片的深色区域的外侧向外渐淡或不渐加深；深色区域的后端角不向外伸或不明显。触角第Ⅰ节大角度稀疏细长毛不明显 19
19. 两性前胸背板胝区淡色或只外侧黑色。爪片与革片刻点细小，大小及相互距离不甚均一
..... 川狭盲蝽 *S. (S.) plebeja*
- 至少雄性胝区黑色，中纵纹常狭窄地黄色。爪片与革片刻点较大而均匀 20

- 20. 阳茎端无长大而分岔的指状囊突 (图 223e) 21
 阳茎端具长大而分岔的指状囊突 (图 223d)。雄触角第 II 节长 3mm 左右
 瘦狭盲蝽 *S. (S.) angustata*
- 21. 体长 8.5~9.2mm。雄触角第 II 节长 4.0~4.4mm 黑胫狭盲蝽 *S. (S.) nigricallum*
 体长 8.29~8.34mm。雄触角第 II 节长 3.4~3.7mm 秦岭狭盲蝽 *S. (S.) quilingsis*

(373) 山地狭盲蝽 *Stenodema (Stenodema) alpestris* Reuter, 1904 (图 220 a, c~d; 图 221 a, c, e~f; 图 223 a, 图版 VIII-10)

Stenodema alpestre Reuter, 1904b: 5, 13; Carvalho, 1959: 303; Zheng, 1981a: 93, 96; Josifov & Kerzhner 1999: 193.

体狭长，多两侧平行。前胸背板两侧与前翅外半在生活时鲜绿色，干标本中为淡黄褐色，体背面其余部分淡栗褐色、紫褐色、淡黑褐色至黑褐色不等。

头同体色，头顶可有一心形淡色斑。额伸出于中叶之上，额端略成短二叉状。触角淡黄褐至淡褐色，第 I、II 节毛多数为淡黑褐至深黑褐，其余毛淡黄至淡褐色；第 I 节相对细长，毛半平伏，密而蓬松，长略短于该节直径，疏生细长的直立细毛，外侧者较




图 220 (a, c~d) 山地狭盲蝽 *Stenodema (Stenodema) alpestris* Reuter;
 (b) 深色狭盲蝽 *Stenodema (Stenodema) elegans* Reuter

a~b. 生殖囊背面观 (星号示开口边缘突起) (genital capsule, asterik showing process on margin of opening); c. 头部背面观 (dorsal view of head); d. 头部侧面观 (lateral view of head)。