



图 219 (a, d~e) 紫褐毛盲蝽 *Lasiomiris purpurascens* Zheng;  
 (b, f~g) 完带毛盲蝽 *Lasiomiris albopilosus* (Lethierry);  
 (c, h~i) 斑纹毛盲蝽 *Lasiomiris picturatus* Zheng

a~c. 阳茎端 (vesica); d, f, h. 右阳基侧突 (right paramere); e, g, i. 左阳基侧突 (left paramere)。

西兴安猫儿山 1650~1780m, 1992.VIII.6, 邹环光采; 1♀, 广西兴安猫儿山 1500~1800m, 1992.VIII.18, 邹环光采; 1♂, 贵州习水三岔河, 800~1000m, 2000.IX.26, 李传仁采。

分布: 福建、广西、四川、贵州、台湾。

(361) 紫褐毛盲蝽 *Lasiomiris purpurascens* Zheng, 1986 (图 219 a, d~e, 图版 VIII-5)

*Lasiomiris purpurascens* Zheng 1986: 88, 91; Schuh 1995: 1010; Kerzhner & Josifov 1999: 185.

体深栗褐色, 略带紫褐色色泽, 表面天鹅绒状, 无光泽。

头栗褐，略具珍珠光泽。被较稀的褐色直立毛与半直立毛，长短及指向不一，沿复眼前缘、头顶侧斜棱周围以及额端处的毛长。额-头顶在中线两侧各有一条较宽的黄色纵带，略弯曲，两端各自相向而末端几相遇，前端达额端，后端会合于头顶中纵沟的中央；中纵沟后有一黄色短纵纹，位于中央，后端伸达前胸前缘，与前胸背板中央黄纹相接；沿复眼内缘为一宽黄带，其内缘向内渐淡，界限不清，前端伸达褐色的触角基，后缘达前胸背板，与后者的侧黄纹相连；唇基背中线有一黄带。额-头顶微拱，中纵沟深陷，明显；由中纵沟后端向两侧斜前伸各有一条褐色低棱，止于复眼内侧黄带的内缘。头顶在中纵沟后端处有一对横列的浅凹，表面结构似粗糙而无光泽。额前端与上顎片前端平齐；唇基远伸过额端。复眼远离前胸背板，表面无毛。头部侧面观长高比为 4:3.6，眼前部分约与眼等长，在眼后有一黄纹与前胸侧面黄纹相连，颊区及小颊黄；小颊下缘浅弧形，后端渐狭，伸达复眼下缘的中点处。触角窝着生于复眼的下 1/3 处，接近眼内缘，但不接触。触角第 I 节淡褐色，被较密的褐色长毛，半直立，多略短于该节直径，外侧有少数更为直立而外指的长毛，长约同该节直径；第 II~IV 节远细，II 的基半淡黄白，渐深，端半淡褐，毛深色，基半毛长可略过该节直径，稀疏，直立，斜外指，端半毛渐短；III、IV 节黑褐，毛密而俯伏。喙略伸过中足基节后缘。

前胸背板底色栗褐，较均匀，具黄色纵纹 5 条，均贯全长，中央黄纹细直，向后均匀地略微加粗；侧黄纹抵前段微向内倾，然后沿抵的内端处折弯，抵后段则略向外斜伸，故此纹整个略呈“X”形。前胸背板表面具若干隐约的刻点状深色小点斑，但无明确的刻点；毛稀疏，直立，长者略长于复眼直径。侧缘在前方 1/5 处凹弯，圆棱状，黄色，有光泽。盘域前的部分平置，盘域中度拱隆。背板前缘均匀后凹。抵约呈长方形，宽大，表面略隆出，二抵互相不连接。侧缘呈细而低的圆棱，前方伸达背板前侧角；前侧角简单；后侧角略压扁，微伸出，末端不尖锐；后缘大体平直。前胸侧面栗褐，背方近背板侧缘处有一黄色纵纹，侧板腹缘后部黄色。

中胸盾片外露，中央区域黑褐，侧区褐，黄纹 3 条与前胸背板及小盾片的 3 条黄纹相接。小盾片微隆，深黑褐，略带紫褐色。毛被同前胸背板。爪片紫褐色，内缘、爪片脉及外缘基部 1/3 黄色。爪片接合缘明显长于中胸盾片与小盾片长之和。外革片、内革片基部 2/5、以及革片内缘黄，其余紫褐色。革片中部纵脉成为黄、紫二区域后半的界限，此脉黄色，略棱出，在革片近中央处向内折弯。爪片及革片毛被似前胸背板。革片外半后端渐带紫红褐色晕斑或点斑。楔片黄，中段或内半红褐，或带有红色碎点斑。缘片外缘直，外缘的毛较密而斜外指，整齐，长约等于后足胫节直径。

足淡褐，股节有色较深的不规则晕斑，大致排成若干横带状。股节及胫节密被直立毛，胫节毛长可达该节直径的 2 倍。腹下黄白色，侧面约一半为红褐色，此区域中的一部分加深成黑褐色的带状。毛长密而半平伏，淡色。

雄性外生殖器如图 219a, d, e。