

(367) 长伸额盲蝽 *Notostira elongata* (Geoffroy, 1785)

*Cimex elongatus* Geoffroy in Fourcroy, 1785: 208.

*Notostira elongata* (Geoffroy): Wagner, 1974: 117; Golub, 1978: 1360; Kerzhner & Josifov, 1999: 189.

体狭长，绿色（干标本黄绿至污黄褐色），有暗色至黑色色斑。

**雄虫：**头黑色，触角窝与眼之间的区域、额的锥突部分后部两侧、头顶后部中央下凹部分或其周边、眼后区域、唇基（除基部外）、下颚片、小颊前半以及沿眼下缘的宽纹绿色或黄色。头长约等于前胸背板中纵线长，与宽度之比为1:1。额的锥突部分伸出于触角窝壁基部之前的长度等于眼长。额的末端较短，二叉形（极短）较明显。眼后缘不接触前胸背板，眼向外侧隆出的程度相对小于*N. sibiricus*。额及头顶中央区域有浅刻点及细皱或微疣。头顶中后部中央区域下凹，头顶中纵沟经过其中央；头顶在眼后角之间有微后弯的宽弧带状微刻区，微刻小网格状，整齐。头部毛淡色，平伏，丝状。触角第Ⅰ节内侧污黄褐，向外渐成红褐色，外下侧或多或少黑色，由基方向端扩展可达全长；第Ⅱ~Ⅳ节淡污红棕色。第Ⅰ节长，伸过头端部分的长度约等于爪片长；毛黑色，刚毛状，短于该节直径，斜伸约成30度角，均匀，较密或密。

前胸背板侧缘与中纵嵴纹区域淡色（绿或黄），其余区域黑色；黑色区域各侧中央或多或少有一间断的黄褐至淡褐色纵带纹，胝前及胝区的此淡纹可成一点斑状。侧缘近后角处微外弯，致使后角微呈外翘的角状（*N. sibiricus* 此处外缘直）。胝前区与盘域刻点粗浅，密度中等；毛淡色丝状，细短而俯伏。

中胸盾片及小盾片黑，小盾片的中纵纹黄绿色，两侧区有时有一隐约的淡色纵带纹；横皱清楚。两前翅内半淡黑褐色至黑褐色，二翅合拢时成一深色宽中带，向后稍稍渐窄，伸达膜片末端；爪片的黑色部分最深，膜片及其上的脉均为深色；剩余的爪片基部区域、革片外半、缘片与楔片均为淡色。半鞘翅毛短小，半平伏，淡色，密度中等，刻点浅密，不甚规则，鲨鱼皮状。

足淡黄绿，略带灰红色色泽；股节散布淡灰褐色小点斑，股节毛直立或半直立，短；后足胫节内侧毛几直立而长密，毛长者略长于该节直径。体下黑，前胸“侧板”边缘淡色，足的基节黑，腹下中部灰黄色，向两侧渐成黑色，生殖囊黑。

左阳基侧突杆部相对较为粗短，端突较显著地膨大，末端部分的尖突明显，略成鹅头状。

**雌虫：**体黑色成分相对较少。

头淡色，背面具3条黑色纵纹，中纹贯全长，侧纹由触角窝内侧沿眼达头的后缘。头侧面观大部淡色，眼前为一黑色纵带，颊区黑色。触角色同雄，第Ⅰ节下方黑色，多贯全长。

前胸背板淡色，具4条黑纵纹，中央一对沿胝内侧后行，外侧一对行经胝外半，均

达前胸背板后缘。中胸盾片部分淡色；小盾片淡色，具一对黑纵带。前翅色斑型同雄，但显然较淡。足与雄相似。

体下淡色；前胸“侧板”中部有一黑色纵带贯全长，中、后胸腹面黑色。

量度 (mm)：体长 7.0~7.5 (♂), 8.7 (♀)；体宽 1.48~1.68 (♂), 1.95 (♀)。头长 1.05~1.08 (♂), 1.15~1.33 (♀)；头宽 1.0 (♂), 1.14 (♀)；头顶宽 0.6 (♂), 0.64 (♀)。触角各节长 1.63:5.9:2.25:1.50 (♂), 2.0:6.25:2.28:1.40 (♀)。前胸背板长 1.03~1.10 (♂), 1.58~1.65 (♀)；后缘宽 1.40~1.45 (♂), 1.53~1.65 (♀)。革片长 3.34~3.63 (♂), 3.64~4.25 (♀)；楔片长 0.80~1.25 (♂), 1.0~1.20 (♀)。

观察标本：9 ♂♂ 9 ♀♀，新疆塔城也门勒乡，2002.VII.24，朱卫兵采。

中国其他分布记录：Golub (1978) 记载“中国西北部”的分布记录；据 I. M. Kerzhner (个人通讯)，此项记录所依据的标本 (ZMAS) 为：1 ♂，巩乃斯河中游，Przewalski 采 (作者按：巩乃斯河位于新疆)。

分布：新疆；蒙古，俄罗斯（东西伯利亚、西西伯利亚），中亚，小亚西亚，中东，高加索，欧洲，北非。

### (368) 山地伸额盲蝽 *Notostira poppiusi* Reuter, 1911 (图版VIII-8)

*Notostira poppiusi* Reuter, 1911: 321; Golub, 1978: 1360; Zheng, 1987: 91; Kerzhner & Josifov, 1999: 190.

**雄虫：**头黑，头顶基部中央有一对淡黄褐色斑，眼内侧及眼后淡黄色。触角污黄褐色，第Ⅱ节以后渐成污黑褐色。触角毛黑，第Ⅰ节毛长约与该节直径相等，第Ⅱ节毛约为该节直径的 1.5 倍。喙伸达中足基节中部。

前胸背板黑，两侧缘宽阔地淡黄褐色，有时后叶中隆嵴处及两侧各有一白斑淡色。前胸背板表面浅皱状，中线微呈隆嵴状。小盾片及爪片黑，革片污黄褐，内半色加深。膜片黑褐色。长翅型。楔片长与膜片伸过楔片长之比为 3:2。足污黄褐色，股节及胫节具黑褐色小点斑。体下方黑，足的基节末端黄白色。

阳茎端端部膜囊只一侧伸出，末端圆钝，其上的齿较宽短。次生生殖孔旁的多齿骨化小体狭尖。

**雌虫：**淡色，黄绿色至淡黄褐色。部分个体头顶中线黑色，或具倒“Y”形黑纹。触角同体色，毛黑褐色，毛长同雄。喙亦同。短翅型个体前胸背板较方，侧缘直，一色，或中线两侧有一略弯曲的黑纹，贯全长；胝区不平整。短翅型个体腹部后方 4 节外露。爪片及革片一色。膜片及其上的二翅室均存在，淡黑褐色，膜片只略伸过楔片末端。体下方淡色。

量度 (mm)：体长 7.0~9.0，体宽 1.5~2.0。头长 1.0~1.1，头宽 1.05~1.1，