

2300m, 1996. V .26, 卜文俊采; 3 ♂♂, 云南景东哀牢山徐家坝, 1989. V .16.

分布: 广东、广西、云南; 日本, 印度。

四、狭盲蝽族 *Stenodemini* China, 1943

Pithanini Douglas *et* Scott, 1865: 28, 280 (*Pithanidae*). **Type Genus:** *Pithanus* Fieber, 1858.

Myrmecorini Reuter, 1883: 564 (*Myrmecoraria*). **Type genus:** *Myrmecoris* Gorske, 1852.

Mirini sensu auctt., nec Hahn, 1833.

Stenodemini China, 1943: 263. **Type genus:** *Stenodema* Laporte, 1833. Official list of family-group names (Opinion 898/1970)

体狭长, 两侧平行, 一般无光泽。唇基多与头部背面垂直。额可向前突伸覆盖于唇基基部之上或否。除少数属外, 头顶背面具明显的中纵沟。触角细长; 第 I 节短于头长与前胸背板长之和。前胸背板前端无界限分明的领部或领的后缘不明显。胫多平坦而宽大。足细长, 后足跗节第 I 节长为第 II 节的 2 倍。

较早期系统中, 常将蚁形的 *Pithanini* 与 *Myrmecorini* 视为独立的族。Schwartz (1987) 认为它们是 *Stenodemini* 的异名, Schuh (1995) 与 Josifov 和 Kerzhner (1999) 从之, 本书亦同此见。

属 检 索 表

- 1. 体蚁形。头大, 明显宽于前胸背板, 侧面观明显高于前胸背板。前胸背板显若具领状, 但“领”的后缘不明显 蚁盲蝽属 *Myrmecoris*
体正常, 不呈蚁形。头不若上述。前胸背板无领 2
- 2. 小盾片具深大而明确的刻点 狭盲蝽属 *Stenodema*
小盾片无刻点, 或具细浅而不甚明确的“刻点” 3
- 3. 触角第 I 节具直立或半直立长毛, 毛至少为该节直径之半 4
触角第 I 节具短而平伏的毛, 毛长不及该节直径之半 7
- 4. 头、前胸背板及小盾片具直立毛, 常较长 5
头、前胸背板及小盾片的毛不直立 6
- 5. 触角第 I 节及后胫毛短于各该节直径 圆额盲蝽属 *Leptopterna*
触角第 I 节及后胫毛长于各该节直径 毛盲蝽属 *Lasiomiris*
- 6. 额向前突伸, 明显伸出并覆盖于唇基基部之上 伸额盲蝽属 *Notostira*
额一般, 不覆盖或略微伸出于唇基基部之上 长盲蝽属 *Dolichomiris*
- 7. 头宽短, 额端几不伸过触角基。触角第 I 节近基部最粗, 然后向端渐细
..... 畸角盲蝽属 *Teratocoris*
头较长, 额端伸过触角第 I 节基部。触角一般 8
- 8. 后胫毛长, 直立, 长于或等于后胫直径。体大, 长在 9.5 mm 以上 瘦盲蝽属 *Acomocera*

后胫毛短于后胫直径。体小，长度在 8.5 mm 以下 赤须盲蝽属 *Trigonotylus*
 [注：Kerzhner & Josifov (1999) 目录中曾记有此族的 *Acitocoris signatus* Reuter 的中国分布记录，现知为误记 (Kerzhner 个人通讯)；因此该属在此检索表中未包括]。

72. 瘦盲蝽属 *Acomocera* Eyles, 1975

Acomocera Eyles, 1975, : 164. **Type species:** *Megaloceroea elongata* Distant, 1904; by monotypy.

体在族内相对较大，甚狭长，两侧平行；光泽弱；体背面几无毛。与 *Dolichomiris* Reuter 属近似。

头平伸，向前渐尖，背面观长三角形，长可略超过前胸背板长；头的眼前部分长约为眼长的 1.5 倍。颈部明显外露，颈长约为眼长之半，略高出于头顶，色斑与头顶以及前胸背板连续一致。头顶具中纵沟，伸达后缘。眼接触颈。触角窝位于眼前方，远离眼，由背面观可见。侧面观唇基前缘略后倾，两侧压扁；上颚片宽三角形，前端平截；下颚片较狭长，筒状棱出，背面观突出于上颚片外；触角窝侧面观位于眼前缘的中央。小颊较短。头背面无毛，无刻点。触角细长；第 I 节粗约为第 II 节的 2 倍，第 II ~ IV 节线形，第 II 节末端略加粗。喙长，伸过后足基节末端。

前胸背板较平置，无毛。无领；前缘后凹，后缘前凹；侧缘具嵴状棱；胝特征同族征，两侧不伸达前胸背板侧缘；胝间有一对小凹点；盘域具细碎不甚规则的刻点，密而较浅。小盾片具浅横皱。半鞘翅具细密刻点同前胸背板，几无毛。足细长，后胫具淡色长毛。后足跗节第 I 跗分节长约等于后 2 个跗分节长度之和。

此属世界已知 3 种，亚洲南部及澳洲界分布。我国已知 2 种。

种 检 索 表

1. 半鞘翅具红色小点斑 长尖瘦盲蝽 *A. longiconea*
 半鞘翅几一色，无红色小点斑 大眼瘦盲蝽 *A. glandiocularis*

(352) 大眼瘦盲蝽 *Acomocera glandiocularis* Lin, 1998

Acomocera glandiocularis Lin, 1998: 27

污黄褐色。

头前端、沿触角窝内缘及眼内缘后延成贯前胸背板侧区中部的纵纹、以及由头顶中纵线后延成贯前胸背板的双纹状中纵带朱红色；下颚片下半以及由此后延至眼后区域为红褐色。触角第 I 节黄褐，背方红褐；第 II 节黄褐，端部 1/3 淡红；第 III ~ IV 节淡红褐；第 I 节毛褐色，半平伏，较密，长约等于第 I 节直径之半，较整齐；第 II 节毛与该节同色，短小，密，长约为直径之半，半平伏。喙明显伸过后足基节末端。头背面无毛