

部分较短；刺 I 与 II 之间的膜囊上的具齿骨化带短于不具齿骨化带，锯齿更为明显；刺 I 基方膜囊颗粒状骨化区形状不同。

量度 (mm)：体长 4.7~6.5，体宽 2.3~3.1。头长 0.4~0.6，头宽 1.0~1.2，头顶宽 (♂) 0.45~0.5，(♀) 0.55~0.62。触角各节长 0.4~0.6:1.75~2.1:0.85~1.0:0.85~1.0。前胸背板长 1.0，后缘宽 1.7~2.3。革片长 2.2~2.8，楔片长 0.96。

模式标本：选模♂，四川康定以北谷地，1893.VII.14，Potanin 采 (存 ZMAS) (未检查)。

观察标本：2♂♂，北京公主坟，1951.IX.16；2♂♂4♀♀，四川马尔康 2500~2800m，1963.VIII.9~11，郑乐怡、邹环光采；2♂♂，同前，刘胜利采；1♀，四川小金两河口，2100m，1983.IX.2，邹环光采；1♀，四川峨眉山报国寺，600m，1957.IV.20，郑乐怡、程汉华采；2♂♂3♀♀，四川雅江，2800m，1985.VIII.8，李新正采；1♀，陕西秦岭青柯坪，1951.IX.7；1♀，陕西太白山中山寺，1951.VIII.21。

中国其他分布记录：四川 (小金抚边、2800m、巴塘 2600m、德格 3200m、康定)，西藏 (芒康) (郑乐怡、李新正，1987)。

分布：北京、四川、陕西、西藏。



图 211 (a~b) 北京异盲蝽 *Polymerus pekinensis* Horváth;

(c~d) 横断异盲蝽 *Polymerus funestus* (Reuter)

a, c. 阳茎端 (vesica); b, d. 阳茎端刺 I 基部骨化区 (sclerotized area near base of spicule I)。

(320) 黑异盲蝽 *Polymerus nigrinus* (Fallén, 1807)

Lygaeus nigrita Fallén, 1807: 87.