

部分较短；刺 I 与 II 之间的膜囊上的具齿骨化带短于不具齿骨化带，锯齿更为明显；刺 I 基方膜囊颗粒状骨化区形状不同。

量度 (mm)：体长 4.7~6.5，体宽 2.3~3.1。头长 0.4~0.6，头宽 1.0~1.2，头顶宽 (♂) 0.45~0.5，(♀) 0.55~0.62。触角各节长 0.4~0.6:1.75~2.1:0.85~1.0:0.85~1.0。前胸背板长 1.0，后缘宽 1.7~2.3。革片长 2.2~2.8，楔片长 0.96。

模式标本：选模 ♂，四川康定以北谷地，1893.VII.14，Potanin 采 (存 ZMAS) (未检查)。

观察标本：2 ♂♂，北京公主坟，1951.IX.16；2 ♂♂ 4 ♀♀，四川马尔康 2500~2800m，1963.VIII.9~11，郑乐怡、邹环光采；2 ♂♂，同前，刘胜利采；1 ♀，四川小金两河口，2100m，1983.IX.2，邹环光采；1 ♀，四川峨眉山报国寺，600m，1957.IV.20，郑乐怡、程汉华采；2 ♂♂ 3 ♀♀，四川雅江，2800m，1985.VIII.8，李新正采；1 ♀，陕西秦岭青柯坪，1951.IX.7；1 ♀，陕西太白山中山寺，1951.VIII.21。

中国其他分布记录：四川 (小金抚边、2800m、巴塘 2600m、德格 3200m、康定)，西藏 (芒康) (郑乐怡、李新正，1987)。

分布：北京、四川、陕西、西藏。



图 211 (a~b) 北京异盲蝽 *Polymerus pekinensis* Horváth;

(c~d) 横断异盲蝽 *Polymerus funestus* (Reuter)

a, c. 阳茎端 (vesica); b, d. 阳茎端刺 I 基部骨化区 (sclerotized area near base of spicule I)。

(320) 黑异盲蝽 *Polymerus nigritus* (Fallén, 1807)

Polymerus nigrinus (Fallén): Carvalho, 1959: 237; Zheng & Li, 1987: 47; Schuh, 1995: 930; Kerzhner & Josifov, 1999: 171.

体型与 *P. carpathicus* 相似。体黑色。身体背面丝状毛金黄色，分布较均匀，不聚成岛状毛斑。

头略斜前倾，侧面观似 *P. carpathicus*，眼明显高于眼下部分。头黑色，头顶两侧有一对暗棕褐色椭圆形斑。额-头顶相对饱满，头顶中纵沟极弱，但其后的侧臂隐约可见，臂的外侧有面积不大的小网格状微刻区，头顶后缘嵴较细。触角各节全部黑色。喙伸达中足基节基部。

前胸背板几平置，几不拱隆，侧面观身体较扁。盘域表面刻皱状，横皱密，明显，刻点亦较密；刚毛状毛褐色，较短密；丝状平伏毛色偏深，呈淡褐色。后缘全黑，中段平直或微向前凹弯。领粗约为头顶后缘嵴的 3~4 倍。

小盾片低平，拱隆甚弱，全部黑色；具横皱。爪片与革片刚毛状毛黑褐至黑色，爪片者较长密，革片者较短；闪光丝状平伏毛略呈淡褐色，部分聚成小毛斑状，或多集中在缘片基半与相邻的革片基外侧、以及革片内缘沿爪片缝的斜带处。爪片与革片表面为不甚整齐的刻皱状，由浅密刻点组成。楔片黑，基部与末端均为淡白色，致使楔片呈中段具黑色大斑状；楔片缝周围淡色。足黑；各足胫节较粗，胫节基半黑，端半黄至黄褐，最端部一段黑，有时基半的黑色部分中央有一黄环；胫节刺黑，基部有一小黑点斑。

量度 (mm): 体长 4.4, 体宽 2.3。头长 0.5, 头宽 1.0, 头顶宽 (♀) 0.5。触角各节长 0.4:1.5:0.8 :?。前胸背板长 0.95, 后缘宽 1.7。革片长 2.1, 楔片长 0.68。

观察标本: 3♀♀, 新疆哈巴河铁烈克提, 1975.VIII.13。

分布: 新疆; 朝鲜, 俄罗斯, 北欧, 中欧。

(321) 泽异盲蝽 *Polymerus palustris* (Reuter, 1907) (图 209 d)

Poeciloscytus unifasciatus var. *palustris* Reuter, 1907b: 18 (upgraded by Butler, 1910: 141).

Polymerus palustris (Reuter): Carvalho, 1959: 238; Zheng & Li, 1987: 48; Schuh, 1995: 931; Kerzhner & Josifov, 1999: 170.

体型与色斑和 *P. brevicornis* 近似，较为狭长，光泽较弱，黑色成分面积较大。

头斜前倾。黑，头顶在眼内侧有一对黄白斑，斑的内缘具小网格状微刻区，成宽带状。上颚片全黑或在与下颚片交界处狭窄地黄色。头顶中纵沟不能分辨。触角污棕色；第 I 节刚毛黑褐色，第 II 节较细，除最末端外，几全长略细于领。喙伸达中足基节中部。

前胸背板拱隆前倾程度较弱。黑，后缘狭窄地黄色。侧缘直或微内凹，后缘宽阔地微后拱。盘域毛二型；刻点密而较明显，刻皱状，但横皱成分显然微弱。领粗约为头顶