

*Polymerus nigritus* (Fallén): Carvalho, 1959: 237; Zheng & Li, 1987: 47; Schuh, 1995: 930; Kerzhner & Josifov, 1999: 171.

体型与 *P. carpathicus* 相似。体黑色。身体背面丝状毛金黄色，分布较均匀，不聚成岛状毛斑。

头略斜前倾，侧面观似 *P. carpathicus*，眼明显高于眼下部分。头黑色，头顶两侧有一对暗棕褐色椭圆形斑。额-头顶相对饱满，头顶中纵沟极弱，但其后的侧臂隐约可见，臂的外侧有面积不大的小网格状微刻区，头顶后缘嵴较细。触角各节全部黑色。喙伸达中足基节基部。

前胸背板几乎平置，几不拱隆，侧面观身体较扁。盘域表面刻皱状，横皱纹密，明显，刻点亦较密；刚毛状毛褐色，较短密；丝状平伏毛色偏深，呈淡褐色。后缘全黑，中段平直或微向前凹弯。领粗约为头顶后缘嵴的3~4倍。

小盾片低平，拱隆甚弱，全部黑色；具横皱纹。爪片与革片刚毛状毛黑褐至黑色，爪片者较长密，革片者较短：闪光丝状平伏毛略呈淡褐色，部分聚成小毛斑状，或多集中在革片基半与相邻的革片基外侧、以及革片内缘沿爪片缝的斜带处。爪片与革片表面为不甚整齐的刻皱状，由浅密刻点组成。楔片黑，基部与末端均为淡白色，致使楔片呈中段具黑色大斑状；楔片缝周围淡色。足黑；各足胫节较粗，胫节基半黑，端半黄至黄褐，最端部一段黑，有时基半的黑色部分中央有一黄环；胫节刺黑，基部有一小黑点斑。

量度 (mm): 体长 4.4，体宽 2.3。头长 0.5，头宽 1.0，头顶宽 (♀) 0.5。触角各节长 0.4:1.5:0.8 :?。前胸背板长 0.95，后缘宽 1.7。革片长 2.1，楔片长 0.68。

观察标本：3♀♀，新疆哈巴河铁烈克提，1975.VIII.13。

分布：新疆；朝鲜，俄罗斯，北欧，中欧。

### (321) 泽异盲蝽 *Polymerus palustris* (Reuter, 1907) (图 209 d)

*Poeciloscytus unifasciatus* var. *palustris* Reuter, 1907b: 18 (upgraded by Butler, 1910: 141).

*Polymerus palustris* (Reuter): Carvalho, 1959: 238; Zheng & Li, 1987: 48; Schuh, 1995: 931; Kerzhner & Josifov, 1999: 170.

体型与色斑和 *P. brevicornis* 近似，较为狭长，光泽较弱，黑色成分面积较大。

头斜前倾。黑，头顶在眼内侧有一对黄白斑，斑的内缘具小网格状微刻区，成宽带状。上颚片全黑或在与下颚片交界处狭窄地黄色。头顶中纵沟不能分辨。触角污棕色；第Ⅰ节刚毛黑褐色，第Ⅱ节较细，除最末端外，几全长略细于领。喙伸达中足基节中部。

前胸背板拱隆前倾程度较弱。黑，后缘狭窄地黄色。侧缘直或微内凹，后缘宽阔地微后拱。盘域毛二型；刻点密而较明显，刻皱状，但横皱纹分显著微弱。领粗约为头顶