

黑，楔片缝周围狭窄地淡黄白，楔片末端亦同。膜片灰黑，脉淡色。体下几全黑，仅中、后胸侧板后缘部分黄白。足黑，各足股节亚端部有一黄白环或只内半有一黄白色半环；胫节基部 $3/5\sim1/2$ 黑，亚基部有一白环，足折叠时与股节亚端部白环组成一连续白纹；胫节其余部分黄白至淡褐，端部黑，中段白色部分中的胫节刺黑色，刺基部有黑色小点斑。

阳茎端刺Ⅰ与Ⅱ之间的膜囊上具2条骨化带，约等长，左侧骨化带锯齿甚浅，几不能辨。刺Ⅰ与刺Ⅲ约等长，明显长于上述骨化带，端部弯曲部分较短。刺Ⅲ基部甚宽。

量度 (mm): 体长 $4.7\sim7.7$ ，体宽 $2.0\sim3.0$ 。头长 $0.4\sim0.6$ ，体宽 $1.0\sim1.2$ ，头顶宽（♂） $0.42\sim0.5$ ，（♀） $0.5\sim0.6$ 。触角各节长 $0.4\sim0.55:1.65\sim1.95:0.65\sim0.8:0.8\sim1.0$ 。前胸背板长 1.13 ，后缘宽 $1.75\sim2.3$ 。革片长 $2.1\sim2.5$ ，楔片长 0.76 。

模式标本：选模♀，北京（存 HNHM）（未检查）。

观察标本：2♂♂5♀♀，北京西山，1957.VI.1，应松鹤、李绍华采；2♂♂1♀，北京卧佛寺，1957.VII.18；1♂，天津蓟县太平沟，600m，1986.VI.1，李新正采；1♂，天津蓟县梨木台 $250\sim640$ m，1986.V.31，李新正采；1♂，山西垣曲，1974.IX.14；2♂♂，内蒙古海拉尔，1981.VIII.9；1♂，吉林高岭子，1959.VII.6~10，M. Volkoff 采；2♂♂5♀♀，黑龙江镜泊湖江山娇，1980.VIII.10，郑乐怡采（*Rubia* sp.）；1♂，浙江杭州城隍山，1957.VIII.18；1♀，安徽太平，1932.X.，G. Liu（刘淦芝）采；1♂，福建崇安三港，1965.VI.23，王良臣采；1♀，江西修武，1981.VIII.19；2♂♂，山东济南，1934.VIII.23；1♂2♀♀，山东崑嵛山老师傅坟，1973.VI.17；1♂2♀♀，河南安阳，1954.VI（茜草）；1♂，云南昆明，1900m，1940.VII.1，J. L. Gressitt 采；1♂1♀，陕西凤县秦岭车站，1965.VIII.18，路进生采；1♀，陕西留坝庙台子，1350m，1998.VII.21，姚建采。

中国其他记录：四川（Taschujwan-Liuigupin [Reuter, 1906b]）。

分布：北京、天津、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、浙江、安徽、福建、江西、山东、四川、云南、陕西；朝鲜，日本。

(323) 斑异盲蝽 *Polymerus unifasciatus* (Fabricius, 1794) (图 209 b, 图版VII-6)

Lygaeus unifasciatus Fabricius, 1794: 178.

Polymerus unifasciatus (Fabricius): Carvalho, 1959: 241; Zheng & Li, 1987: 47; Schuh, 1995: 933; Kerzhner & Josifov, 1999: 170.

Miris semiflavus Wolff, 1804: 154. Synonymized by Fallén, 1807: 80.

雌雄异型明显，雄体较长大，侧缘直；雌相对短宽而侧缘略圆拱。略具光泽。

头近垂直或斜前倾。黑色，上颚片有时色较淡，褐至黑褐色；头顶两侧在眼内方各有一黄斑，斑的内方可见小网格状微刻区。唇基与额之间明显下凹。头顶中纵沟甚浅，

几不可辨；头顶后缘嵴清楚；毛银白色，平伏，丝状；上颚片三角形，前端尖，伸达唇基长之半处。触角多全黑，或第Ⅰ节褐色或部分褐色，第Ⅱ节可能为深黑褐；第Ⅰ节长度的 $1/4$ 伸过头端。喙伸达前足基节与中足基节之间。

前胸背板较平置，黑，后缘狭细地黄白色；侧缘直，后缘微后拱；领粗，约为头后缘嵴粗的4倍；胝仅微隆，界限不甚清楚，胝密布毛，同盘域，二胝不相连。盘域刻点细碎，不甚整齐，呈刻皱状，胝间区最为深密，向后向两侧渐弱；毛二型。

小盾片黑，端角有较大的黄白斑；向中央略拱隆，表面具不规则浅横皱。爪片全黑。革片底色黑；缘片（黑色的后端除外）与革片基半外半黄白，此区域沿革片中部纵脉成小尖状向后伸展；革片内角有一黄白色纵椭圆形斑，外端角大斑黄白色；爪片与革片表面呈不规则浅皱状，几看不到明确的刻点；闪光丝状毛密，平伏，长度中等。缘片外缘狭细地黑褐色。楔片长度明显大于宽，大部棕红色，基缘与端缘处渐成黄白色，基内角成三角形不大的黑斑状，楔片沿外缘有一大黑斑，纵长形至半椭圆形，向周围渐淡；楔片刚毛状毛黑色。膜片灰黑，脉黄白。足黑，股节端半有时斑驳地黄白色；胫节淡色，胫节刺黑，刺基有明显的黑色点斑。

体下黑。前胸腹板与侧板后缘以及臭腺沟缘后缘淡黄白。

阳茎端构型同 *P. pekinensis*，但刺Ⅰ全长狭细。刺Ⅰ与Ⅱ之间的膜囊上的不具齿骨化带甚长，约与刺Ⅰ等长；具齿骨化带基部 $2/3$ 具明显锯齿，端部 $1/3$ 转为多列颗粒突起。

量度 (mm)；体长 5.0~6.8，体宽 1.9~2.8。头长 0.4~0.5，头宽 0.9~1.2，头顶宽 (♂) 0.45~0.48，(♀) 0.52~0.55。触角各节长 0.45~0.65:1.6~2.7:0.9~1.1:0.8~0.9。前胸背板长 0.88，后缘宽 1.5~2.15。革片长 2.0~3.3，楔片长 1.20。

观察标本：1 ♂ 2 ♀ ♀，河北小五台天儿岭，1917.VIII.9；1 ♀，河北围场；1 ♀，内蒙古海拉尔，1981.VIII.9，郑乐怡采；6 ♂ ♂ 4 ♀ ♀，四川若尔盖达扎寺 3300m，1963.VII.29，邹环光、郑乐怡采；29 ♂ ♂ 40 ♀ ♀，四川若尔盖唐克，1983.VIII.2，刘胜利采；1 ♀，四川理县刷经寺 3150m，1963.VIII.21，郑乐怡采；2 ♂ ♂，四川小金两河口，2200m，1963.VIII.16，郑乐怡采；1 ♀，甘肃岷县二郎山 2350m，1986.VII.29，李新正采；2 ♂ ♂，新疆布尔津喀纳斯湖，1300m，1983.VII.21，李彦发采。

分布：河北、内蒙古、四川、甘肃、新疆；朝鲜，日本，蒙古，俄罗斯（西伯利亚、远东地区），中亚，欧洲，北非，北美。

(324) 淡胸异盲蝽 *Polymerus vulneratus* (Wolff, 1801) (图 210 c~d)

Lygaeus vulneratus Wolff, 1801: 100.

Polymerus vulneratus (Wolff): Carvalho, 1959: 243; Zheng & Li, 1987: 50; Schuh, 1995: 934; Kerzhner & Josifov, 1999: 170.