

体较小而色淡，底色灰黄，黑斑色淡而面积小，为此属我国已知颜色最淡的种类。体光泽不强。

头部黄，头顶后缘以及由此发出位于中线的短纵纹黑色，成“T”字形，然后在头中线处散成隐约的褐斑，前方达唇基末端，深浅不一。触角污黄褐；第Ⅰ节毛黑色，刚毛状；第Ⅱ节较粗，端部渐略加粗，全长几均粗于领。喙略伸过中胸腹板后缘。

前胸背板黄；胫区有一对黑斑，大小不一；前侧角无黑斑或有一褐色至黑褐色小斑，斑的光泽与质地同前胸背板其他区域；近侧缘处有一黑色纵带，可在后侧角处内弯；盘域表面呈不甚规则而较密的刻皱状，略细碎，刻点较明显；刚毛状毛淡色或较深，短小，半平伏，前侧角处的毛半直立；平伏丝光毛少，银白色，略长于刚毛状毛。胫甚低平，界限不甚明显。领略粗于头顶后缘嵴粗的2倍。

小盾片黑，端部黄斑极大，多少成心脏形，斑的长度约等于小盾片长。爪片灰黄，或中部加深；革片深色斑颜色相对较淡，内半端部2/5及中部纵脉外侧色深，向周边渐淡；革片遍布黑色短刚毛状毛，向前分布达于革片基部，较密而平伏；闪光丝状毛约与刚毛状毛等长。缘片外缘黑。楔片红，两端淡黄，外缘前半黑。膜片灰色。体下方几全黄，中胸侧板内半及腹板黑或仅腹板黑，各足淡色，胫节刺黑褐色，刺基部有一小黑点斑。

阳茎端构造与 *P. cognatus* 极为相似，区别之处有：刺Ⅰ与Ⅱ之间膜囊上的具齿骨化带更为短宽。

量度 (mm)：体长 4.5~5.3，体宽 2.0~2.3。头长 0.4~0.55，头宽 0.95~1.1，头顶宽 (♂) 0.4~0.42，(♀) 0.45~0.5。触角各节长 0.4~0.48:1.45~1.6:?:?。前胸背板长 0.98，后缘宽 1.7~1.9。革片长 2.2~2.5，楔片长 0.88。

观察标本：3 ♂♂ 1 ♀，新疆哈巴河，1975.VIII.7；1 ♂，新疆沙湾，1979.VIII.20，马德诚采；1 ♂，新疆 88 团场，1981.VI.15，吴文贵采。

分布：新疆；中亚，土耳其，欧洲，阿拉斯加，加拿大西北部。

60. 帕盲蝽属 *Poppiocapsidea* Yasunaga, 1998

Poppiocapsidea Yasunaga, 1998a: 68. **Type species:** *Megacoelum clypeale* Poppius, 1915; by monotypy.

体较大，长椭圆形，两侧近平行，略厚，具光泽。

头半垂直，额-头顶区均匀饱满，光滑，头顶具深长的中纵沟，头顶后缘光滑无隆嵴；头部毛淡色，短，较平伏。

前胸背板较明显地前倾，饱满，有光泽；领明显，有光泽，无毛；盘域无刻点，侧缘直，侧面观钝圆；胫光滑，略隆出，两胫相连。小盾片较平，具横皱。半鞘翅鲨鱼皮状或呈浅密刻点-鲨鱼皮状；毛淡色近平伏。

胫节下方具半直立密毛。

阳茎端的特点为次生生殖孔周围具许多膜质毛状突起，向内部分遮盖次生生殖孔 (Yasunaga, 1998)。

东洋界分布。世界已知 2 种。我国已知 1 种。

(325) 黑唇帕盲蝽 *Poppiocapsidea clypealis* (Poppius, 1915) (图版 VII-7)

Megacoelum clypeale Poppius, 1915a: 14; Carvalho, 1959: 159; Schuh, 1995: 832.

Poppiocapsidea clypealis (Poppius): Yasunaga, 1998a: 69; Kerzhner & Josifov, 1999: 171.

体较大，长椭圆形，有光泽。

头垂直；淡黄褐或黄褐色，唇基黑或唇基、额前部或大部以及头顶的三角形大斑黑褐色；头顶中纵沟深而长，色深，后端在近头顶后缘前分为二岔；雌虫头顶宽约与眼等宽，雄虫眼宽约为头顶宽的 1.5 倍。喙伸后足基节基部或端部。触角第 I 节淡黄白或浅黑褐色，向端成黑褐；第 II 节淡黄白，端部 1/3 渐成黑褐色；作者所观察的标本第 III、IV 节缺失（据 Yasunaga (1998)，触角第 II 节略长于第 III 节；第 III 节约与第 II 节等粗，长于前胸背板后缘宽）。

前胸背板较前倾，饱满，淡黄褐或带有橙色色泽。领同色，有光泽。领中部延至胝间区为一约成倒三角形的黑斑或淡黑斑；其后在胝间区后的中线上为一不大的黑斑，约成菱形或水滴状；在此斑的后面于盘域偏后的中线上有一长形或长椭圆形黑斑，伸达背板后缘；后二黑斑可连成一两侧平行的黑纵带。盘域具光泽，表面无刻点及横皱，但不甚平整；未见毛。前胸背板后缘宽阔地弧弯。胝同色，界限清楚但较平，表面与盘域约等高，光滑。

小盾片整体微抬升，表面平，淡黄褐或黄褐色，具密横皱。半鞘翅光泽弱；爪片一色深栗褐或深锈褐色，缘片淡黄褐；革片黄褐至淡褐色，常近半透明，并因革片下的腹部衬垫之故而致革片内方约 2/3 外观常成黑褐色；爪片及革片毛淡色，较平伏而较密；楔片外缘不宽地淡黄褐色，其余黑或红黑色，色深而显著；楔片具毛，同爪片与革片。足淡黄褐；前足胫节下方白色毛密，半直立而长；后足胫节下方密生半平伏毛，长接近淡褐色的胫节刺。

体下淡黄褐，腹下有橙红色色泽。

量度 (mm)：体长 7.0~8.5，体宽 2.75~3.0。头长 0.50，头宽 (♂) 1.35，(♀) 1.40，头顶宽 (♂) 0.33，(♀) 0.45。前胸背板长 1.20，后缘宽 2.10。革片长 3.33，楔片长 1.0。

模式标本：正模♀，台湾高雄县甲仙（存 DEIC）（未检查）。

观察标本：2♂♂2♀♀，台湾南投惠孙林场，1990. II. 20，C. S. Tseng 采，灯诱 (NMNH)。